

MEMORIA TÉCNICA

CANTÓN PALANDA

PROYECTO:

**“LEVANTAMIENTO DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
ESCALA 1:25.000, LOTE 2”**

GEOMORFOLOGÍA

MAYO, 2015

PERSONAL PARTICIPANTE

Unidad MAGAP-PRAT, SIGTIERRAS:

José Duque
Sandra González
Xavier Andrade
Óscar Garzón

Consorcio TRACASA-NIPSA:

Responsables:

Joaquín del Val
Idurre Barinagarrementería

Memoria:

Javier Reina
Juan Agustín Núñez
Fernando Guerrero
Marta San Segundo
Anna Bordetas
Baldomer Corderroure
Jorge Navarro
Oriol Pedraza
Lorena Piedra
Anna Pibernat
Isaac Pérez

Fotointérpretes:

Sergio Andrade
Lucía Avilés
Anna Bordetas
Leonardo Calle
Baldomer Corderroure
Yetzabel Flores
Jorge Navarro
Juan Agustín Núñez
Katia Olivos
Oriol Pedraza
Isaac Pérez
Lorena Piedra
Anna Pibernat
Javier Reina
Angélica Robles
Mariana de J. Yaguana

FISCALIZACIÓN realizada por la Asociación ACOTECNIC – INGEOMATICA

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	1
1.1.	El Proyecto de Cartografía Temática de Ecuador	2
1.2.	Objetivos	3
1.2.1.	Objetivos generales del proyecto	3
1.2.2.	Objetivos del estudio geomorfológico	3
1.3.	Antecedentes de este estudio	4
II.	METODOLOGÍA	5
2.1.	Características del producto esperado	5
2.2.	Etapas metodológicas.....	5
2.2.1.	Recopilación de información	6
2.2.1.1.	Insumos básicos: MDT, ortofotos y otras imágenes	6
2.2.1.2.	Insumos complementarios	6
2.2.2.	Fotointerpretación	7
2.2.2.1.	<i>Software</i> empleado	9
2.2.3.	Fase de campo	9
2.2.3.1.	Criterios para la validación en campo	9
2.2.3.2.	Validación y adquisición de datos de campo	9
2.2.4.	Integración de datos y adecuación cartográfica final	10
2.2.5.	Mapa y leyenda	10
2.2.5.1.	Explicación de la leyenda	10
2.2.5.2.	Esquemas: Relieve y Paisaje (Contextos Morfológicos), Esquema Geológico y Pendientes	13
2.3.	Control de calidad.....	14
2.4.	Insumos utilizados para la cartografía geomorfológica del cantón	15
III.	RESULTADOS.....	17
3.1.	Levantamiento de información.....	17
3.2.	Regiones y Dominios Fisiográficos.....	18
3.2.1.	Dominio Fisiográfico Cimas frías de las Cordilleras Occidental y Real	19
3.2.2.	Dominio Fisiográfico Vertientes externas de la Cordillera Real	19
3.2.3.	Dominio Fisiográfico Medio aluvial de Sierra	20
3.2.4.	Dominio Fisiográfico Zona Subandina	20
3.3.	Contextos Morfológicos.....	22

3.3.1. Paisajes glaciares	22
3.3.2. Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)	22
3.3.3. Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real).....	23
3.3.4. Medio aluvial de Sierra	23
3.3.5. Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas.....	23
3.4. Geformas y formaciones geológicas presentes en el cantón	24
3.5. Descripción de geformas	29
3.5.1. Fluvial	29
3.5.1.1. Valle fluvial, llanura de inundación (F1)	29
3.5.1.2. Valle en V (E1)	29
3.5.1.3. Barranco (E2)	30
3.5.1.4. Encañonamiento (E4).....	31
3.5.1.5. Terraza media (Tm)	32
3.5.1.6. Terraza colgada (Tc)	32
3.5.1.7. Vertiente o abrupto de terraza (Tv).....	32
3.5.2. Laderas	32
3.5.2.1. Vertiente rectilínea (Lr1).....	32
3.5.2.2. Vertiente rectilínea con fuerte disección (Lr2).....	33
3.5.2.3. Vertiente rectilínea con abruptos (Lr4)	33
3.5.2.4. Vertiente abrupta (La1)	34
3.5.2.5. Vertiente abrupta con fuerte disección (La2)	34
3.5.2.6. Vertiente heterogénea (Lh1)	35
3.5.2.7. Vertiente heterogénea con fuerte disección (Lh4)	36
3.5.2.8. Escarpe de deslizamiento (Lh6)	36
3.5.2.9. Coluvión antiguo (Col2).....	37
3.5.2.10. Depósitos de deslizamiento, masa deslizada (Ld1)	37
3.5.3. Glaciar y periglaciar	38
3.5.3.1. Circo glaciar (Gf1)	38
3.5.3.2. Cubeta glaciar (Gf2).....	38
3.5.3.3. Fondo de valle glaciar (Gf3)	38
3.5.3.4. Vertiente de valle glaciar (Gf4).....	39
3.5.3.5. Depósito glaciar modelado por acción fluvial (Gd6)	39
3.5.4. Volcánico	39
3.5.4.1. Relieve volcánico colinado medio (Rv9)	39
3.5.4.2. Relieve volcánico colinado muy alto (Rv10).....	40

3.5.5. Estructural.....	40
3.5.5.1. Superficie de mesa o meseta disectada (Eh2).....	40
3.5.5.2. Cornisa de mesa o meseta (Eh3).....	40
3.5.5.3. Vertiente de mesa o meseta (Eh4).....	40
3.5.5.4. Superficie de cuesta (Ei1).....	41
3.5.5.5. Superficie de cuesta disectada (Ei2).....	41
3.5.5.6. Frente de cuesta (Ei3).....	41
3.5.5.7. Vertiente de cuesta (Ei4).....	41
3.5.5.8. Superficie de chevron (Ei5).....	42
3.5.5.9. Frente de chevron (Ei6).....	42
3.5.5.10. Vertiente de chevron (Ei7).....	42
3.5.5.11. Barra o cresta estructural (Esv).....	42
3.5.5.12. Restos de superficie estructural (Esr).....	43
3.5.6. Tectónico-erosivo.....	43
3.5.6.1. Relieve colinado medio (Rt4).....	43
3.5.6.2. Relieve colinado alto (Rt5).....	43
3.5.6.3. Relieve colinado muy alto (Rt6).....	44
3.5.6.4. Relieve montañoso (Rt7).....	45
3.5.7. Poligénicas.....	45
3.5.7.1. Coluvio-aluvial reciente (Coa1).....	45
3.5.7.2. Coluvio-aluvial antiguo (Coa2).....	46
3.5.7.3. Superficie inclinada disectada (Si3).....	46
3.5.7.4. Interfluvio de cimas redondeadas (Ar1).....	47
3.5.7.5. Interfluvio de cimas estrechas (Ar2).....	48
IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES.....	49
V. BIBLIOGRAFÍA.....	52
5.1. Referencias generales.....	52
5.2. Bibliografía citada.....	53

ANEXO I. MODELO DE FICHA DE CAMPO

ANEXO II. CÓDIGOS DE FICHAS DE CAMPO LEVANTADAS EN EL CANTÓN

ANEXO III. GLOSARIO DE GEOFORMAS

ANEXO IV. ATRIBUTOS DE LAS GEOFORMAS

LISTA DE CUADROS

Cuadro 2.1. Grupos genéticos y subgrupos en que se encuadran las geoformas	11
Cuadro 2.2. Índice de cartas topográficas utilizadas para el cantón Palanda	16
Cuadro 3.1. Regiones y dominios fisiográficos presentes en el cantón Palanda	19
Cuadro 3.2. Contextos morfológicos presentes en el cantón Palanda	22
Cuadro 3.3. Contextos morfológicos y geoformas presentes en el cantón	24
Cuadro 3.4. Formaciones geológicas y depósitos superficiales presentes en el cantón	27

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1. Distribución geográfica de la zona de estudio dentro del área continental	2
Figura 2.1. Mapa sintético de procesos en el diseño y producción de la cartografía geomorfológica	5
Figura 2.2. Plan de calidad en la cartografía geomorfológica, principales hitos	14
Figura 2.3. Insumos de base de generación de los MDT en el cantón Palanda	15
Figura 3.1. Localización de recorridos y fichas de campo del cantón Palanda	17
Figura 3.2. Distribución geográfica de los diferentes dominios fisiográficos presentes en el cantón Palanda	18

LISTA DE FOTOS

Foto 1. Valle fluvial, llanura de inundación. Sector Valladolid.....	29
Foto 2. Valle en V en el río Numbala sobre el Batolito de Zamora. Sector Sanguinuma	30
Foto 3. Barranco en la Quebrada de Los Muertos. Sector Ventanillas	31
Foto 4. Encañonamiento en el río Palanda. Sector San Antonio de Las Juntas.....	31
Foto 5. Vertiente abrupta. Sector Cruz del Soldado	34
Foto 6. Vertiente abrupta con fuerte disección. Sector Loma Paredones.....	35
Foto 7. Vertiente heterogénea. Sector Cordillera del Vergel	35
Foto 8. Vertiente heterogénea con fuerte disección. Sector Numbala.....	36
Foto 9. Coluvión antiguo. Vista general en el Sector Río Loyola	37
Foto 10. Relieve colinado alto. Sector La Canela.....	44
Foto 11. Relieve colinado muy alto. Sector Santa Clara del Vergel	44
Foto 12. Relieve montañoso. Sector Palanda.....	45
Foto 13. Coluvio-aluvial antiguo en el río Nanchina. Sector Finca Nanchina	46
Foto 14. Interfluvio de cimas redondeadas. Sector Loma Huayracruz	47

I. INTRODUCCIÓN

El 1 de febrero de 2011, la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo suscribieron el Contrato de Préstamo 2461/OC-EC, cuyo objetivo es la implantación en todo el país de un sistema eficiente de gestión de catastro y registro de la propiedad de la tierra rural, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a los derechos de propiedad, apoyar la aplicación de políticas tributarias de los cantones, y proveer información para la planificación de ordenamiento territorial del área rural.

El proyecto es ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, MAGAP, a través de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, dentro del Programa denominado como SIGTIERRAS.

Actualmente, el proyecto gestiona, entre otros, los siguientes componentes:

- Fotografía aérea y ortofotografía a nivel nacional.
- Levantamiento de información de barrido predial, con participación de los GAD Municipales, en 58 cantones.
- Elaboración de cartografía temática en coordinación con otras iniciativas gubernamentales.
- Actualización de la metodología y aplicación para la valoración predial.
- Puesta en marcha del nuevo sistema SINAT.

Dentro del componente de cartografía temática, en una labor conjunta con el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), MAGAP-SIGTIERRAS genera cartografía temática a Escala 1:25.000 de las siguientes temáticas:

1. Cobertura y uso de la tierra
2. Sistemas productivos
3. Geomorfología
4. Suelos
5. Capacidad de uso de la tierra
6. Dificultad de labranza
7. Zonas homogéneas de cultivos
8. Peligros volcánicos
9. Accesibilidad a la red vial
10. Accesibilidad a infraestructura de acopio y facilidades agrícolas
11. Accesibilidad a centros económicos importantes
12. Zonas homogéneas de accesibilidad

Este levantamiento se ejecuta por parte de MAGAP-SIGTIERRAS dentro del territorio continental no intervenido ya anteriormente (áreas a cargo del IEE) y excluyendo las áreas protegidas definidas en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), organizado en dos lotes de acuerdo a la siguiente figura (Figura 1.1).

Figura 1.1. Distribución geográfica de la zona de estudio dentro del área continental.



Fuente: CTN

1.1. El Proyecto de Cartografía Temática de Ecuador

El Levantamiento de Cartografía Temática a Escala 1:25.000 de Ecuador (LCT) pretende generar, en un área de trabajo de 122.095 km², cartografía digital y bases de datos territoriales sobre: Geomorfología, Suelos y su Capacidad de uso, Dificultad de Labranza, Cobertura y uso de la tierra, Zonas homogéneas de cultivo y Sistemas Productivos. Para todo el territorio nacional se ha realizado la actualización de la cartografía existente de Peligros Volcánicos y se han elaborado cartografías de Accesibilidad a la Red Vial, a Infraestructuras de Acopio y Facilidades Agrícolas, a Centros Económicos Importantes y Zonas Homogéneas de Accesibilidad.

El proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, consta de dos LOTES, según consta en la Figura 1.1:

- i. LOTE 1, que ocupa una superficie de 70.645 km²; y,
- ii. LOTE 2, que ocupa una superficie de 51.450 km² y en ambos se incluyen las temáticas a nivel de territorio nacional.

Los dos lotes fueron adjudicados al Consorcio TRACASA-NIPSA (CTN) mediante los Contratos de Servicios de Consultoría Nos. UE MAGAP-PRAT-105-2013 para el Levantamiento de Cartografía Temática a Escala 1:25.000, Lote 1 y UE MAGAP-PRAT-106-2013 para el Levantamiento de Cartografía Temática a Escala 1:25.000, Lote 2, ambos con fecha 9 de diciembre de 2013.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivos generales del proyecto

El proyecto de Levantamiento de Cartografía Temática (LCT) tiene como objetivos generales, entre otros, los siguientes:

- Identificar la calidad del suelo de todo el país.
- Identificar sus mejores usos: cultivos más productivos y tecnologías más adecuadas para el territorio.
- Apoyar al mejor uso y aprovechamiento de los recursos vegetales del territorio y contribuir a elevar su productividad agropecuaria.
- Apoyar la planificación y el ordenamiento territorial a nivel parroquial, cantonal, municipal y provincial.

La Cartografía Geomorfológica, dentro de los objetivos generales del conjunto del proyecto, aporta las bases de conocimiento del paisaje físico y constituye uno de los principales insumos para el levantamiento edafológico, formando con éste la componente Geopedológica. De hecho, para entender los procesos de formación de suelos se ha de disponer de un profundo conocimiento de su entorno geomorfológico. La geopedología, por lo tanto, se entiende como la integración de la geomorfología y la pedología usando como herramienta la primera para mejorar y acelerar los levantamientos de suelos, así como para implementar un modelo espacial que facilite su caracterización y permita establecer sus posibles relaciones con el paisaje.

1.2.2. Objetivos del estudio geomorfológico

Los objetivos específicos de la Cartografía Geomorfológica son:

- Generar una cartografía y base de datos asociada que permitan comprender el territorio de estudio desde el punto de vista de su relieve y paisaje físico.
- Categorizar el territorio, a través de un sistema jerárquico, en unidades que presentan rasgos y características comunes según la escala de análisis realizada. De más general a más particular, el territorio queda definido por diferentes Regiones, Dominios Fisiográficos, Contextos Morfológicos y Geoformas (o Unidades Geomorfológicas), categoría ésta última que supone la de mayor detalle de las consideradas.
- Disponer de una cartografía de referencia que, además de su utilidad para el levantamiento edafológico, constituya un elemento de referencia para otras actividades del proyecto y una fuente de información fundamental para la implementación de planes, programas y proyectos con incidencia en el territorio.

1.3. Antecedentes de este estudio

El Gobierno del Ecuador requirió disponer entre sus estrategias, a finales de la década pasada, de un conjunto de geoinformación que contribuyera a la gestión territorial, mejoramiento y sostenibilidad de la productividad agraria. El proyecto de Generación de Geoinformación fue declarado prioritario por el Gobierno Nacional, en consideración a la necesidad de contar con información fundamental actualizada sobre aspectos edáficos, hidrológicos, climáticos y socioeconómicos, importantes para el desarrollo del país. El estudio geomorfológico queda incluido como una de las actividades del proyecto.

SIGTIERRAS, Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP), gestiona la construcción de una base de datos de tierras rurales y se encarga de obtener y proporcionar información para la planificación del desarrollo nacional, el ordenamiento territorial y las decisiones estratégicas para el área rural, entre otras funciones. Desde 2013 es responsable de continuar con el proyecto de Cartografía Temática, iniciado unos años antes.

La generación de geoinformación, con metodología y planteamientos que en gran parte se continúan en este proyecto, fue comenzada por CLIRSEN (actualmente IEE, Instituto Espacial Ecuatoriano) en 2009, en coordinación con SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). Ese mismo organismo ya había llevado a cabo diversos estudios geomorfológicos con anterioridad, que seguían, a grandes rasgos, las pautas establecidas en trabajos anteriores generados en el convenio PRONAREG-ORSTOM.

El PRONAREG (Programa Nacional de Regionalización Agraria), del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, fue un programa que trabajó en los años 70 y 80 del pasado siglo XX, para realizar el inventario socioeconómico y de los recursos naturales renovables, en el que colaboró la institución francesa ORSTOM (*Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer*). Consecuencia de esta colaboración fueron los mapas morfopedológicos (escalas 1:200.000 y 1:500.000), realizados entre los años 1979 a 1984, destacada fuente de información territorial a pequeña-mediana escala. La colaboración PRONAREG-ORSTOM culminó, en lo que se refiere específicamente a la relación entre paisaje, geomorfología y suelos, con la publicación "Los paisajes naturales del Ecuador: las regiones y paisajes del Ecuador" (IPGH, ORSTOM e IGM, 1997, bajo la coordinación científica de A. Winckell). En dicha publicación, además, se incluye el Mapa de *Paisajes Naturales del Ecuador* a escala 1:1.000.000. Este trabajo es, desde su aparición, la principal referencia a nivel nacional en las temáticas geomorfológica y geopedológica.

II. METODOLOGÍA

2.1. Características del producto esperado

El área general de trabajo se localiza en el territorio nacional continental, siendo la unidad de estudio el cantón.

Como parámetros y unidades específicas de trabajo se establecen las siguientes:

- Escala: 1: 25.000
- Nivel de Estudio: semi-detallado
- Unidad mínima de mapeo: 1 ha
- Sistema espacial de referencia: SIRGAS UTM Zonas 17S y 18S
- Formato digital de entrega: *.gdb
- Insumos básicos: ortofotos, modelo digital del terreno (MDT), mapas geológicos, de paisaje, geomorfológicos y morfopedológicos
- Técnica: fotointerpretación geomorfológica digital 3D
- Campo: comprobación de unidades geomorfológicas interpretadas
- Productos a entregar: mapa temático y memoria técnica geomorfológica

2.2. Etapas metodológicas

Los principales procesos llevados a cabo en las fases de diseño y producción de la cartografía geomorfológica se esquematizan en la figura 2.1.

Figura 2.1. Mapa sintético de procesos en el diseño y producción de la cartografía geomorfológica.



Fuente: CTN

En los siguientes subapartados, se sintetizan las principales actividades y tareas que se han llevado a cabo para cubrir los objetivos del estudio geomorfológico y para la obtención de los diferentes productos de que consta.

2.2.1. Recopilación de información

Esta fase comprende:

- Preparación de los insumos básicos: MDT y ortofotos (en áreas no cubiertas por ortofotos se utilizan distintos tipos de imágenes satelitales).
- Preparación y obtención de información auxiliar: red de drenaje, mapa de pendientes y mapa de sombras con efecto 3D a partir del MDT (*hillshade*).
- Revisión de otros levantamientos y cartografías preexistentes y de su disponibilidad: mapas morfológicos, geológicos, morfopedológicos, mapas topográficos y mapas de curvas de nivel, principalmente.

2.2.1.1. Insumos básicos: MDT, ortofotos y otras imágenes

En algo más del 90% del área de estudio, se dispone de MDT y ortofotos, facilitados por SIGTIERRAS. En estas zonas, se procede directamente a construir el modelo estéreo sintético por carta 1:50.000.

En el área restante, se genera el MDT de dos formas: a) en zonas de cierta amplitud y continuidad (que, en total, representan unos 10.300 km²), se utilizan los fotogramas de los vuelos 1:60.000 del IGM y se procede a su aerotriangulación con el apoyo de la cartografía 1:50.000, finalizando mediante un proceso de correlación hasta obtener el MDT; b) en pequeñas zonas y pasillos sin MDT ni ortofotos (que suponen alrededor de 480 km²), se genera el MDT utilizando la información de las curvas de nivel de la cartografía 1:50.000 y otros MDT disponibles, de tal forma que queden en continuidad con el resto del territorio colindante.

En las zonas no cubiertas por ortofotos, se dispone de alguna de las siguientes imágenes satelitales: Rapideye, Spot 6, VHR, WorldView-1 y WorldView-2.

2.2.1.2. Insumos complementarios

Los insumos complementarios, básicamente, son:

- Cartografía geológica. La base principal de esta información procede de la cartografía geológica del INIGEMM (Instituto Nacional de Investigación Geológica, Minero, Metalúrgico), a escalas 1:100.000 (Sierra y Costa) y 1:250.000 (Oriente). Dicha cartografía geológica fue proporcionada al inicio de este proyecto, en febrero de 2014, por el mencionado organismo, competente en el levantamiento y difusión de dicha información, y que constituye el principal referente de tal información.
La mayoría de estos mapas están publicados por instituciones antecesoras al INIGEMM, organismo que asume desde 2009 las competencias referidas a la generación de información geológica del país y que con anterioridad fue denominado DGGM (Dirección General de Geología y Minas) y CODIGEM

(Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico-Minero-Metalúrgica). Otros organismos, como INEMIN (Instituto Ecuatoriano de Minería), también participaron en la publicación de algunas de estas cartas.

Asimismo, se han utilizado otras fuentes de información en función de la situación del área a fotointerpretar, de la disponibilidad de cartografías geológicas públicas y de carácter oficial, y de que dichas cartografías cubrieran, bajo criterios homogéneos, una extensión significativa de territorio. Los mapas geológicos de la República del Ecuador a escala 1:1.000.000 (años 1982 y 1993), el Mapa Geológico de la Cordillera Occidental del Ecuador (escala 1:200.000, años 1997 y 1998) y el Mapa Geológico de la Cordillera Oriental (escala 1:500.000, año 1994), preparados y publicados por la CODIGEM con la colaboración de organismos británicos, han sido otras fuentes de información geológica adicionales.

- Mapas geomorfológicos, morfopedológicos y de suelos, realizados por PRONAREG-ORSTOM, a escala 1:200.000 (Costa y Sierra) y 1:500.000 (Amazonía), realizados entre los años 1979 y 1984.
- Mapas de sombras con efecto 3D, elaborado a partir del MDT y el modelo *hillshade* de ArcMap.
- Red de drenaje generada a partir del MDT, con ayuda de la delimitada en la cartografía a escala 1:5.000. Las herramientas que se utilizan para su obtención son ArcGIS 10, ArcHydro y ETGeowizard.
- Mapa de pendientes. Información generada a partir del MDT (de 3 metros en Sierra, 4 metros en Costa y 5 metros en Amazonía).
- Mapa de Paisajes Naturales del Ecuador, escala 1: 1.000.000 (Winckell, 1997), cartografía que ha servido de base para establecer el sistema de jerarquía del relieve en que se estructura la información geomorfológica.
- Mapa topográfico 1:50.000. Mapa en formato *raster*, que sirve de referencia para una primera comprensión del relieve y sus formas más características, así como para conocer la extensión de la red vial. Además, proporciona la información básica sobre la toponimia.
- Curvas de nivel de los mapas topográficos 1:50.000. Esta información, en formato vectorial, sirve para una primera contextualización del mapa, como una ayuda a la delimitación de recintos y una herramienta adicional para comprobación o corrección de ciertos parámetros (pendientes, desnivel relativo, longitud de vertiente) que caracterizan a dichos recintos.

2.2.2. Fotointerpretación

La fotointerpretación es la técnica básica de adquisición de información para la elaboración del mapa geomorfológico. Consiste en la subdivisión del territorio en Unidades Geomorfológicas, o Geoformas, entendidas éstas como porciones del paisaje identificables respecto a las de su entorno inmediato y que presentan características homogéneas en cuanto a su génesis (procesos formadores), morfología (forma del terreno), morfometría (pendiente, desnivel relativo, longitud de vertiente), procesos morfodinámicos actuantes y material constitutivo (formación geológica o depósito superficial sobre el que se asienta).

La metodología se basa en la generación de información básica, obtenida a partir de la fotointerpretación digital 3D con los insumos principales (MDT y ortofotos) y tomando como referente los insumos complementarios anteriormente citados.

El proceso de fotointerpretación cubre las siguientes etapas:

- Identificación y delimitación de las diferentes geoformas, o unidades geomorfológicas, existentes en el área, en base a las características del relieve, los modelos de drenaje y la información proporcionada por los diferentes insumos. La delimitación de las geoformas se realiza mediante digitalización de polígonos identificados como geoformas, a Escala 1:10.000, con líneas que aparezcan suavizadas, a partir del modelo tridimensional utilizado.
- Asignación de atributos en cada geoforma delimitada, con ayuda del software implementado.

La asignación de atributos a cada una de las geoformas delimitadas permite caracterizarlas a través de una serie de rangos o variables específicos de cada atributo, definidas previamente. Los atributos considerados son los siguientes:

- Nombre de la geoforma.
- Región, Dominio Fisiográfico y Contexto Morfológico (atributos relacionados con las unidades jerárquicas de relieve en que se encuadra la geoforma).
- Génesis (grupo genético, o tipo de modelado, al que pertenece cada tipo de geoforma).
- Formación geológica y litología.
- Forma de la cima, forma de la vertiente y forma del valle (atributos morfológicos).
- Desnivel relativo, longitud de vertiente y pendiente (atributos morfométricos).
- Forma de drenaje y densidad de drenaje (atributos relacionados con el drenaje superficial).

Las principales características de cada uno de estos atributos y los rangos o valores que pueden tomar se detallan en el Anexo IV: Atributos de las geoformas.

Cada geoforma delimitada, tal como se explica en dicho Anexo IV, se encuadra en un sistema jerárquico de relieve y paisaje, que contempla tres niveles u órdenes. De más general a más particular son:

- Región
- Dominio Fisiográfico
- Contexto Morfológico

La fotointerpretación finaliza con:

- Definición de puntos para su posterior comprobación sobre el terreno y definición de itinerarios (*tracks*) a realizar en campo.
- Revisión cartográfica de los polígonos (delimitación y topología), su empate con hojas adyacentes y la correcta asignación de atributos de todos los polígonos, mediante las reglas y criterios de validación establecidos.

2.2.2.1. Software empleado

El sistema de trabajo se basa en la tecnología ArcSDE (motor de base espacial), un componente básico de ArcGIS Server. Gestiona los datos espaciales en un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) y le permite acceder a los clientes de ArcGIS. Los fotointérpretes trabajan sobre la misma *Geodatabase* (GdB), de tal manera que cada nuevo recinto digitalizado aparece reflejado inmediatamente en la GdB y el resto de fotointérpretes lo puede visualizar.

La herramienta de producción de la cartografía geomorfológica se fundamenta en la combinación de *Purview* y *Vector Factory*, ambas integradas en ArcGis. La herramienta *Purview* permite la visión tridimensional, así como editar y digitalizar en 3D de forma directa. *Vector Factory* facilita, desde una pantalla táctil, la ejecución y enlace de múltiples comandos y opciones, reduciendo sensiblemente el número de clics por parte del operador.

2.2.3. Fase de campo

2.2.3.1. Criterios para la validación en campo

Obtenidos los mapas preliminares, se procede a realizar el trabajo de campo con el objetivo de verificar *in situ* las unidades geomorfológicas cartografiadas y sus atributos.

La actividad en el campo consiste en realizar recorridos, principalmente a través de ejes viales transitables en vehículo 4x4, complementados con desplazamientos a pie, con el objetivo de caracterizar los puntos de comprobación prefijados y adecuar la cartografía preliminar. Es primordial encontrar sitios con afloramientos donde se pueda verificar la relación Unidad Geomorfológica y tipo de roca o depósito superficial, visitando el mayor número posible de tipos de unidades geomorfológicas.

2.2.3.2. Validación y adquisición de datos de campo

En campo, la actividad contempla:

- Visita a los puntos definidos en el itinerario y descripción de los mismos mediante ficha de campo, incorporada a la *tablet* (ver Anexo I). Verificación de atributos asignados en gabinete y corrección de los mismos, en su caso.
- Generación de documentación asociada (itinerarios o "*tracks*" y puntos de observación georreferenciados directamente a partir de la *tablet*, así como toma de fotografías con el mismo dispositivo).

- Ubicación de afloramientos existentes para la descripción del macizo rocoso o depósito superficial (en la misma ficha).
- Toma de muestras si resulta necesario.
- Identificación de unidades geomorfológicas no interpretadas o dudosas.

En ciertos cantones pueden no existir fichas de campo, debido a la imposibilidad de recorrerlos por ausencia de viales transitables en la época prevista de realización de la campaña de campo. En estas situaciones, se tomó en consideración para la fotointerpretación y la asignación de los correspondientes atributos las fichas levantadas en otros cantones limítrofes o próximos, que guardaran relación morfológica con el cantón en el que dichos recorridos no pudieron llevarse a cabo.

2.2.4. Integración de datos y adecuación cartográfica final

La información recopilada en campo se procesa en gabinete. Para ello, se ingresa en el sistema la información recogida en el dispositivo de campo (*tablet*) y se procede a la corrección y ajuste de unidades geomorfológicas. Complementariamente, se prepara un reporte interno con las principales incidencias (fecha de visita de la hoja u hojas validadas, calidad y cobertura de la infraestructura vial, porcentaje de puntos visitados sobre el total previsto, adecuación del equipamiento y material de campo, etc.).

2.2.5. Mapa y leyenda

Una vez finalizadas las etapas anteriores, se procede a la preparación de la salida cartográfica.

Como pasos finales, se ingresan los límites constantes a la fotointerpretación: base topográfica, cuerpos de agua, Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) y límites cantonales. Se prepara el *layout* (composición del plano para la salida gráfica) y se ajusta el diseño para su impresión en PDF o papel. La salida cartográfica se realiza por hoja 1:50.000 y por cantón.

En el esquema geológico del *layout* los polígonos menores a 100 ha aparecen con el color correspondiente a su edad geológica pero no se etiquetan ni se muestran en la leyenda de formaciones.

2.2.5.1. Explicación de la leyenda

En la leyenda del mapa aparecen las distintas geoformas identificadas en el territorio que representa el mapa, ordenadas según génesis (grupos y, en su caso, subgrupos). A todas las geoformas se les asigna una clave identificativa única (de entre 2 y 4 caracteres), colores que ayuden a identificarlas en relación al grupo o subgrupo genético en el que se encuadran y, en el caso de geoformas que llevan depósitos superficiales asociados, una trama.

En el Anexo III se presenta un glosario de todas las geoformas contempladas en el proyecto.

El número de grupos genéticos considerados en el área de estudio del proyecto suponen un total de trece. Algunos de ellos presentan, además, subdivisiones que aglutinan geoformas con rasgos morfológicos similares o que obedecen a procesos formadores muy análogos. Los grupos y subgrupos considerados se presentan en el Cuadro 2.1. Las principales características de estos trece grupos genéticos se recogen en el Anexo IV (Atributos de las geoformas).

Cuadro 2.1. Grupos genéticos y subgrupos en que se encuadran las geoformas.

GRUPO GENÉTICO (tipo general de modelado)	SUBGRUPO	EJEMPLOS DE GEOFORMAS	CLAVE
FLUVIAL	Valles fluviales y formas relacionadas con predominio de sedimentación	Valle fluvial, llanura de inundación	F1
	Encajamientos e incisiones fluviales	Barranco	E2
	Canales fluviales	Cauces y meandros ocasionalmente funcionales	C2
	Terrazas	Terraza media	Tm
	Conos de esparcimiento	Superficie de cono de esparcimiento disectado	Co2
	Conos de deyección	Superficie de cono de deyección disectado	Cd3
	Otras formas	<i>Badlands</i>	Fb1
FLUVIO-LACUSTRE	En valles-terrazas	Áreas endorreicas en llanuras aluviales y terrazas	Fl1
	En otros ambientes	Depresión lagunar	Fo1
LADERAS	Laderas rectilíneas	Vertiente rectilínea con salientes rocosos	Lr3
	Laderas abruptas	Vertiente abrupta con fuerte disección	La2
	Laderas heterogéneas y otras morfologías	Vertiente heterogénea con fuerte disección	Lh4
	Depósitos de ladera	Coluvión antiguo	Col2
	Piedemonte	Glacis de esparcimiento	Pd1
GLACIAR Y PERIGLACIAR	Formas glaciares	Circo glaciar	Gf1
	Depósitos glaciares	Morrena de fondo	Gd1
	Periglaciar	Afloramientos rocosos en ambiente periglaciar	Gp3

Cuadro 2.1. Grupos genéticos y subgrupos en que se encuadran las geoformas (continuación).

GRUPO GENÉTICO (tipo general de modelado)	SUBGRUPO	EJEMPLOS DE GEOFORMAS	CLAVE
VOLCÁNICO	Antiguos edificios	Pitones o agujas volcánicas	Va2
	Conos inactivos	Cono sin actividad volcánica actual e intenso retoque glaciar	Vci1
	Conos activos	Cono muy bien conservado con actividad volcánica actual y sin retoque glaciar	Vca3
	Formas asociadas a conos	Rampas de piedemonte de cono volcánico	Vc8
	Domos	Domo volcánico	Dom
	Relieves diversos	Relieve volcánico colinado alto	Rv10
MARINO	Depósitos actuales	Playa marina	Mac1
KÁRSTICO	-	Dolina, campo de dolinas	Kt6
METEORIZACIÓN	-	Colinas en media naranja	Met1
EÓLICO	-	Campo de dunas	Eod2
ESTRUCTURAL	Capas horizontales	Superficie de mesa o meseta	Eh1
	Capas inclinadas	Frente de cuesta	Ei3
	Capas subverticales	Barra o cresta estructural	Esv
	Capas plegadas	Superficies y planos estructurales originados en capas plegadas	Epl
	Superficies residuales	Restos de superficie estructural	Esr
	En materiales volcánicos	Niveles estructurales sobre lavas endurecidas	Ev1
TECTÓNICO-EROSIVO	-	Relieve colinado medio	Rt4
POLIGÉNICAS	Coluvio aluvial	Coluvio-aluvial reciente	Coa1
	Superficies de erosión y planicies intermontanas	Planicie intermontana	SP3
	Superficies horizontales	Superficie horizontal disectada	Sh3
	Superficies inclinadas	Abrupto de superficie inclinada	Si4
	Altas superficies	Superficie alta disectada	Sa2
	Relieves residuales	Cerro testigo	Rr4
	Aristas, divisorias e interfluvios	Interfluvio de cimas redondeadas	Ar1
	Sustrato diverso	Macizo rocoso	Sdv1
OTRAS	-	Superficie intervenida	O5

Fuente: CTN

2.2.5.2. Esquemas: Relieve y Paisaje (Contextos Morfológicos), Esquema Geológico y Pendientes

En estos tres esquemas, a Escala 1:250.000, se recoge información complementaria al mapa principal. Dicha información cartográfica se elabora, para su adecuada lectura y representación, mediante un proceso de generalización cartográfica.

El esquema de *Relieve y Paisaje* presenta los Contextos Morfológicos identificados en el área del mapa. En el Anexo IV (Atributos de las geoformas, epígrafe 1) se explica el sistema de jerarquía de relieve adoptado, en el que los Contextos Morfológicos representan uno de los niveles u órdenes contemplados, así como la relación de todos ellos y su inclusión en los diferentes Dominios Fisiográficos y Regiones.

En el *Esquema Geológico* aparecen las distintas formaciones geológicas del mapa, con la asignación de un símbolo que las identifica, coloreadas según edades. Los símbolos empleados para cada una de las formaciones geológicas o depósitos superficiales no tienen carácter oficial, aunque para ello se ha tenido en cuenta la simbología utilizada en publicaciones de amplio reconocimiento y uso: hojas geológicas 1:100.000 y 1:250.000 publicadas por el INIGEMM u organismos predecesores y Léxico estratigráfico del Ecuador (Bristow y Hoffstetter, 1977). Especialmente para depósitos superficiales y otros grupos litológicos que no tienen reconocimiento de formación, así como para ciertas formaciones geológicas, se ha acordado la adopción de códigos propios, siguiendo criterios análogos a los utilizados en dichos trabajos de referencia. Por otro lado cabe aclarar que las edades han sido asignadas conforme lo determina la cartografía 1:100.000 y por ende los cuerpos intrusivos posteriormente datados por el CODIGEM-BGS (a diferentes escalas y años de edición), constan sin edad en el esquema geológico.


El término "formación" está utilizado en sentido amplio e incluye tanto a rocas del sustrato ("*bedrock*", en terminología anglosajona) como a formaciones o depósitos superficiales, habitualmente del Cuaternario. En el Anexo IV (epígrafe 3, Atributos geológicos: formación geológica y litología) se explica con mayor detalle las denominaciones empleadas y su significado.

El esquema de *Pendientes* recoge los distintos rangos de inclinación existentes en el área, expresados en porcentaje. La denominación de los diferentes rangos de pendiente y su inclinación porcentual son: plana (de 0 a 2%), muy suave (de más de 2% a 5%), suave (de más de 5% a 12%), media (de más de 12% a 25%), media a fuerte (de más de 25% a 40%), fuerte (de más de 40% a 70%), muy fuerte (de más de 70% a 100%) y escarpada (más de 100%).

2.3. Control de calidad

La Gestión de Calidad en los trabajos de cartografía geomorfológica se enmarca y es coherente con el Plan de Calidad del conjunto del proyecto del que forma parte. Dicho Plan de Calidad afecta a todos los procesos y productos del trabajo y señala los principales hitos que debe cumplir para cada una de las temáticas, cuyas relaciones con los principales procesos se muestran en la Figura 2.2.

Figura 2.2. Plan de calidad en la cartografía geomorfológica, principales hitos.



Fuente: CTN


Estos hitos son los siguientes:

- Competencia y equipo de trabajo multidisciplinar para llevar a cabo las tareas y actividades previstas. Además de la adecuada selección de personal, se ha llevado a cabo la capacitación oportuna para homogeneizar criterios y enseñar el manejo de las herramientas de trabajo.
- Revisión y verificación de la disponibilidad de los datos de entrada (insumos básicos e insumos complementarios).
- Verificación de que todos los productos obtenidos en la fase de diseño (Geodatabase, Modelo de Datos y Catálogo de Objetos; Metodología; Manuales y Procedimientos) se adecúan a los requisitos y especificaciones.
- Control topológico y coherencia cartográfica.
- Control de calidad temática, tanto a lo largo del proceso de fotointerpretación como a la finalización del mismo.

2.4. Insumos utilizados para la cartografía geomorfológica del cantón

Se ha utilizado el conjunto de la información referida en los apartados 2.2.1.1 (Insumos básicos: MDT, ortofotos y otras imágenes) y 2.2.1.2 (Insumos complementarios). En lo que respecta a los insumos de base de generación de los MDT, en el cantón Palanda se han utilizado los que aparecen en la Figura 2.3.

Figura 2.3. Insumos de base de generación de los MDT en el cantón Palanda.



Fuente: CTN

En lo referente a la información geológica, las principales fuentes de información utilizadas han sido:

- CODIGEM (Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico Minero Metalúrgica), 1996. Hoja Geológica: Zamora (Hoja 77), esc. 1:100.000. *CODIGEM*. Quito.
- DGGM-INEMIN (Dirección General de Geología y Minas; Instituto Ecuatoriano de Minería), 1987. Mapa Geológico de la Provincia de Zamora Chinchipe, esc. 1:250.000. *DGGM*. Quito.
- DGGM-UK (Dirección General de Geología y Minas; Misión Británica), 1975. Hoja Geológica: Gonzanamá (Hoja 57), esc. 1:100.000. *DGGM*. Quito.
- DGGM-UK (Dirección General de Geología y Minas; Misión Británica), 1979. Hoja Geológica: Las Aradas (Hoja 58), esc. 1:100.000. *DGGM*. Quito.
- DGGM-UK (Dirección General de Geología y Minas; Misión Británica), 1979. Hoja Geológica: Zumba (Hoja 59), esc. 1:100.000. *DGGM*. Quito.
- CODIGEM-BGS (Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico-Minero Metalúrgica; British Geological Survey), 1994. Geological and metal occurrence maps of the Cordillera Real Metamorphic Belt, Ecuador, esc. 1:500.000. (Publicado en 2 hojas). *CODIGEM*. Quito.

Para la ubicación general y la toponimia del cantón, se emplearon las hojas topográficas a Escala 1:50.000 proporcionadas por el IGM (Instituto Geográfico Militar), recogidas en el Cuadro 2.2.

Cuadro 2.2. Índice de cartas topográficas utilizadas para el cantón Palanda.

Código	Cartas Topográficas
NVII_B4	Vilcabamba
NVII_D1	Las Aradas
NVII_D2	Yangana
NVII_D3	Amaluza
NVII_D4	Valladolid
NVII_F1	Laguna Cox
NVII_F2	San Francisco del Vergel (Río Mayo)
ÑVII_C1	Playa de Oro
ÑVII_C3	La Canela
ÑVII_E1	Río El Vergel

Fuente: IGM (Instituto Geográfico Militar)


III. RESULTADOS

3.1. Levantamiento de información

La comprobación de campo del cantón Palanda se realizó entre los días 4 y 9 de febrero de 2015, con varios recorridos previamente establecidos por todo el cantón. Finalmente se levantaron fichas de campo de 103 puntos (Figura 3.1 y Anexo II).

Toda esta información se ingresó en una base de datos *SQL Server*, en la que igualmente queda registrada la cartografía digital.

Figura 3.1. Localización de recorridos y fichas de campo del cantón Palanda.



Fuente: CTN


La definición y características de las diferentes Regiones, Dominios Fisiográficos y Contextos Morfológicos, que se explican los siguientes apartados 3.2 y 3.3, están basadas en Winckell (1997).

3.2. Regiones y Dominios Fisiográficos

Territorialmente el cantón Palanda tiene 2.042 km² aproximadamente, de los cuales el presente estudio geomorfológico contempla 1.503 km², ya que las restantes pertenecen al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (Parque Nacional Yasuni, Parque Nacional Podocarpus y Reserva Biológica Cerro Plateado) y/o al área de intervención del Instituto Espacial Ecuatoriano. Todas las cifras porcentuales, parciales y totales que se presentan en esta memoria corresponden exclusivamente al área de intervención de este estudio.

El cantón se encuentra principalmente incluido en la región Sierra y una pequeña parte en la región Amazonía y dentro de estas regiones se diferencian cuatro dominios fisiográficos. Su distribución geográfica se presenta en la Figura 3.2, y la extensión que ocupa cada uno de ellos en el cantón se muestra en el Cuadro 3.1.

Figura 3.2. Distribución geográfica de los diferentes dominios fisiográficos presentes en el cantón Palanda.



Fuente: CTN

Cuadro 3.1. Regiones y dominios fisiográficos presentes en el cantón Palanda.

REGIÓN	DOMINIO FISIOGRAFICO	Superficie (*)	Porcentaje (*)
SIERRA	Cimas frías de las Cordilleras Occidental y Real	35 km ²	2,3%
	Vertientes externas de la Cordillera Real	1.215 km ²	80,9%
	Medio aluvial de Sierra	9 km ²	0,6%
AMAZONÍA	Zona Subandina	244 km ²	16,2%

(*) Superficies y porcentajes referidos a la zona de estudio dentro del cantón
Fuente: CTN

3.2.1. Dominio Fisiográfico Cimas frías de las Cordilleras Occidental y Real

Las Cimas frías de las Cordilleras Occidental y Real aparecen con una notable fragmentación geográfica, desde la frontera colombiana hasta el sur de Amaluza, en la frontera peruana. Las tierras más frías dibujan dos fajas paralelas con sentido meridiano que coronan las dos cordilleras Andinas, occidental y oriental. La altitud es el primer punto en común a esos paisajes: alcanza los 6.310 msnm en el volcán Chimborazo, mientras que sus límites inferiores oscilan, como promedio, entre 3.300 y 3.400 msnm en la zona norte del país y entre 3.100 y 3.200 msnm hacia Amaluza, en el sur.

En este cantón se encuentran los típicos paisajes glaciares, localizados en el contexto de mismo nombre, que caracterizan este dominio. Con alturas de aproximadamente 3.600 msnm en los puntos más elevados de la Cordillera de Sabanilla, situada en la zona noroeste del cantón en el límite con el cantón Loja. Presenta una pequeña extensión, en dos áreas separadas por el valle del río Blanco.

3.2.2. Dominio Fisiográfico Vertientes externas de la Cordillera Real

Las Vertientes externas de la Cordillera Real constituyen el dominio fisiográfico situado entre el de Cimas frías y la Zona Subandina de la región Amazonía. Da lugar, en conjunto, a menores desniveles que el dominio equivalente de la Cordillera Occidental y se desarrolla fundamentalmente sobre formaciones metamórficas, flanqueadas por cuerpos intrusivos, con o sin cobertura piroclástica. Por su posición escalonada, entre 1.200 y 3.500 msnm al norte, y entre aproximadamente 1.000 y 3.000 msnm al sur, representa la transición entre los modelados glaciares andinos y los relieves subandinos amazónicos. En el caso del cantón Palanda, que se encuentra en la zona sur del país, las aturas del dominio llegan hasta los 3.100 msnm y descienden hasta los 1.500 msnm en el contacto con la Zona Subandina.

En el cantón Palanda, este dominio se dispone prácticamente en todo el cantón, excepto en el extremo oriental y parte de la zona noroccidental, siendo el más amplio del cantón. Se encuentran dos modelados distintos, los relieves escarpados

desarrollados sobre rocas metamórficas y las vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas.

Los modelados, sobre las rocas metamórficas, se caracterizan por una disección aguda, irregular y asimétrica, que se ve influenciada por:

- Las direcciones estructurales del conjunto. Su expresión en el relieve se caracteriza sobre todo por alineamientos muy visibles de crestas agudas en sentido N-S y por una disimetría de las vertientes oriental y occidental.
- La naturaleza de las facies dominantes. Los materiales más blandos (esquistos y filitas) dieron lugar a formas en "hueco": valles alargados y corredores más o menos deprimidos, mientras que las litologías más resistentes (gneises y sobre todo cuarcitas), arman los principales relieves: barras rocosas, relieves resistentes a la erosión, etc.

En las rocas ígneas intrusivas, principalmente representadas por los granitoides del Batolito de Zamora, el relieve presenta una disección mucho más homogénea y regular, sin orientaciones preferentes. A menudo la roca aparece con intensas alteraciones, tanto arenizaciones como otras en que se aprecian profundas argilizaciones y enriquecimiento en óxidos e hidróxidos de hierro.

3.2.3. Dominio Fisiográfico Medio aluvial de Sierra

El dominio incluye las diferentes formas fluviales de la red hidrográfica actual y sus depósitos asociados.

Se consideran pertenecientes a este dominio los valles fluviales-llanuras de inundación y sistemas de terrazas asociados, que presentan una escasa extensión en este cantón. Las formas fluviales de incisión (barrancos, valles en V, encañonamientos) y ciertas formas poligénicas ligadas directamente al drenaje (coluvio-aluviales) se incluyen dentro del contexto morfológico en que se emplacen, salvo que manifiesten continuidad con el resto del sistema fluvial y atraviesen más de un contexto morfológico.

En el cantón Palanda este dominio está representado por el sistema fluvial de los ríos Palanda, Numbala y Valladolid, que se ubican desde el centro al sur del cantón, con dirección N-S, y también se encuentra en tramos de los ríos Vergel y Blanco, que son afluentes de los anteriores. Está conformado por un único contexto morfológico que lleva su mismo nombre. Los barrancos son las geoformas más representativas del dominio.

3.2.4. Dominio Fisiográfico Zona Subandina

Está representado por relieves montañosos o colinados medios, altos o muy altos, escalonados, en los que se apoya, de norte a sur, la vertiente amazónica de los Andes. Este dominio está fuertemente condicionado por levantamiento del Santiago, más fuertemente accidentado que su homólogo del norte, el levantamiento del Napo, mientras que esta estructura hacia el sur, atraviesa el cantón Palanda y conforma su expresión morfológica más característica, representada por la Cordillera del Cóndor.

El anticlinal subandino, producido por el levantamiento del Santiago, está constituido por sedimentos mesozoicos, de naturaleza marina y continental. El modelado está formado por un relieve homogéneo constituido de una multitud de colinas vigorosas con cimas redondeadas y largas vertientes convexas empinadas. En esta zona del país, este dominio no ha sido recubierto por cenizas volcánicas, manteniendo sus coberturas edáficas, a diferencia de su representación en el norte (la Cordillera del Napo).

En el cantón Palanda representa el segundo dominio fisiográfico más extenso. Se dispone a lo largo de todo el borde oriental, con alturas que oscilan entre los 1.400 y los 3.000 msnm. Se encuentra un único contexto morfológico dentro de este dominio, denominado *Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas*, en el que las laderas constituyen el modelado más representativo.

3.3. Contextos Morfológicos

Los contextos morfológicos presentes en el área de estudio, dentro del cantón Palanda y en relación con los respectivos dominios fisiográficos y regiones a los que pertenecen, se presentan en el Cuadro 3.2.

Cuadro 3.2. Contextos morfológicos presentes en el cantón Palanda.

REGIÓN	DOMINIO FISIAGRÁFICO	CONTEXTO MORFOLÓGICO
SIERRA	Cimas frías de las Cordilleras Occidental y Real	Paisajes glaciares
	Vertientes externas de la Cordillera Real	Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)
		Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)
	Medio aluvial de Sierra	Medio aluvial de Sierra
AMAZONÍA	Zona Subandina	Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas

Fuente: CTN

3.3.1. Paisajes glaciares

Se presenta en las tierras más frías de la Cordillera Real, cuyas morfologías más características se corresponden con formas y depósitos glaciares, actuales y heredados, como circos y cubetas glaciares, vertientes y fondos de valle glaciar y también depósitos glaciares modelados por la acción fluvial.

Este contexto se encuentra ubicado al noroeste, en el límite con el cantón Loja, ocupando una extensión de 35 km², a ambos lados del valle del río Blanco.

3.3.2. Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)

Se presenta este contexto en el extremo más meridional del Ecuador: al sureste de Amaluza, encajado entre relieves labrados sobre rocas metamórficas y los retazos más al sur de los *Paisajes glaciares*; y en forma de corredor a ambos lados de los ríos Palanda y Numbala, que discurre con dirección norte-sur al este de Zumba. También aparece en otros reducidos emplazamientos que salpican la vertiente andina oriental, al sur de la cordillera. En el cantón Palanda se encuentra en una superficie

aproximada de 511 km², ubicada en gran parte de la mitad oriental del cantón sin llegar a ocupar el borde oriental del mismo. Se sitúa entre alturas de 800 y 2.600 msnm.

Presenta características similares al contexto análogo situado en la vertiente occidental: intensa alteración, disección homogénea, regular y densa y ausencia de direccionalidad en su modelado. Se encuentra un modelado tectónico-erosivo extenso representado por relieves colinados y montañosos y diferentes tipos de laderas.

3.3.3. Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)

Se extiende a lo largo de una banda continua por todo el tercio sur de la vertiente oriental de la Cordillera Real, para este cantón se encuentra desde la línea imaginaria que une Loja y Zamora hasta la punta más meridional del Ecuador, al sur de Zumba.

El paisaje, con ausencia de cenizas volcánicas, se define por una disección intensa, irregular y asimétrica del sustrato metamórfico sobre el que mayoritariamente se desarrolla. Se sitúa entre, aproximadamente, 3.500 y 1.000 msnm, representando la transición entre el modelado glaciar y periglacial andino y los relieves subandinos.

En el cantón Palanda, este contexto se ubica principalmente en la mitad occidental del cantón, ocupando su mayor parte, y en una menor extensión, localizado sobre la Cordillera de Numbala, en el centro del cantón. Presenta una superficie de 705 km² aproximadamente.

3.3.4. Medio aluvial de Sierra

Este contexto es coincidente con el dominio fisiográfico del mismo nombre, cuyas características generales se han descrito en el apartado 3.2.3.

3.3.5. Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas

El modelado predominante, muy homogéneo, da lugar a colinas y relieves montañosos de pronunciados desniveles, de cimas redondeadas y largas vertientes convexas. La red es densa y escasamente jerarquizada, característica de los cuerpos ígneos intrusivos, granitos y granodioritas, sobre los que se desarrolla. Las alteraciones adquieren una extraordinaria intensidad y extensión sobre estos materiales, tanto en forma de arenizaciones como en transformaciones a niveles arcillosos rojizos y rojizo-amarillentos, con cuarzo y ricos en hierro.

Se encuentran también gran diversidad de vertientes y geoformas de carácter estructural, mesas, chevrones y cuevas, proporcionadas por las areniscas de la Formación Hollín, discordantes sobre los relieves graníticos subyacentes.

Este contexto morfológico se encuentra, en la franja oriental del cantón, en el límite con Perú y con el cantón Nangaritza al noreste. Ocupa una superficie aproximada de 244 km².

3.4. Geoformas y formaciones geológicas presentes en el cantón

En el Cuadro 3.3 se presentan las geoformas identificadas en cada contexto morfológico, ordenadas por grupos genéticos. Se indica la superficie aproximada que ocupa cada geoforma en el correspondiente contexto morfológico.

Cuadro 3.3. Contextos morfológicos y geoformas presentes en el cantón.

CONTEXTO MORFOLOGICO	GRUPO GENÉTICO	GEOFORMA	km ² (aprox.)
Paisajes glaciares	FLUVIAL	Barranco	<1
	LADERAS	Vertiente rectilínea	1
		Vertiente abrupta	3
		Vertiente heterogénea	3
	GLACIAR Y PERIGLACIAR	Circo glaciar	9
		Cubeta glaciar	<1
		Fondo de valle glaciar	5
		Vertiente de valle glaciar	5
		Depósito glaciar modelado por acción fluvial	1
TECTÓNICO-EROSIVO	Relieve montañoso	<1	
POLIGÉNICAS	Interfluvio de cimas estrechas	5	
Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)	FLUVIAL	Valle en V	12
		Barranco	44
		Encañonamiento	<1
	LADERAS	Vertiente rectilínea	43
		Vertiente rectilínea con fuerte disección	6
		Vertiente rectilínea con abruptos	6
		Vertiente heterogénea	163
		Vertiente heterogénea con fuerte disección	279
		Vertiente abrupta	40
		Vertiente abrupta con fuerte disección	13
		Escarpe de deslizamiento	<1
		Depósitos de deslizamiento, masa deslizada	2
	Coluvión antiguo	9	
	GLACIAR Y PERIGLACIAR	Depósito glaciar modelado por acción fluvial	1
	TECTÓNICO EROSIVO	Relieve colinado medio	<1
		Relieve colinado alto	5
		Relieve colinado muy alto	12
		Relieve montañoso	63
	POLIGÉNICAS	Coluvio-aluvial antiguo	2
		Superficie inclinada disectada	1
Interfluvio de cimas estrechas		3	
Interfluvio de cimas redondeadas		3	

Cuadro 3.3. Contextos morfológicos y geoformas presentes en el cantón (continuación).

CONTEXTO MORFOLÓGICO	GRUPO GENÉTICO	GEOFORMA	km ² (aprox.)
Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)	FLUVIAL	Valle fluvial, llanura de inundación	2
		Valle en V	7
		Barranco	21
		Terraza media	<1
		Terraza colgada	<1
		Vertiente o abrupto de terraza	<1
	LADERAS	Vertiente rectilínea	7
		Vertiente rectilínea con fuerte disección	6
		Vertiente heterogénea	55
		Vertiente heterogénea con fuerte disección	66
		Vertiente abrupta	1
		Vertiente abrupta con fuerte disección	22
		Depósitos de deslizamiento, masa deslizada	<1
	TECTÓNICO EROSIVO	Coluvión antiguo	6
		Relieve colinado medio	2
		Relieve colinado alto	13
		Relieve colinado muy alto	57
	POLIGÉNICAS	Relieve montañoso	231
Coluvio-aluvial reciente		<1	
Coluvio-aluvial antiguo		9	
Medio aluvial de Sierra	FLUVIAL	Interfluvio de cimas redondeadas	3
		Valle fluvial, llanura de inundación	2
		Valle en V	6
		Encañonamiento	<1
Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas	FLUVIAL	Terraza media	<1
		Valle fluvial, llanura de inundación	2
		Valle en V	4
	LADERAS	Barranco	14
		Vertiente rectilínea	14
		Vertiente rectilínea con fuerte disección	10
		Vertiente rectilínea con abruptos	2
		Vertiente heterogénea	72
		Vertiente heterogénea con fuerte disección	12
		Vertiente abrupta	8
Coluvión antiguo	9		

Cuadro 3.3. Contextos morfológicos y geoformas presentes en el cantón (continuación).

CONTEXTO MORFOLÓGICO	GRUPO GENÉTICO	GEOFORMA	km ² (aprox.)
Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas	VOLCÁNICO	Relieve volcánico colinado medio	1
		Relieve volcánico colinado muy alto	3
	ESTRUCTURAL	Superficie de mesa o meseta disectada	1
		Cornisa de mesa o meseta	<1
		Vertiente de mesa o meseta	2
		Superficie de cuesta	3
		Superficie de cuesta disectada	<1
		Frente de cuesta	5
		Vertiente de cuesta	11
		Superficie de chevron	3
		Frente de chevron	<1
		Vertiente de chevron	<1
		Barra o cresta estructural	2
		Restos de superficie estructural	5
	TECTÓNICO-EROSIVO	Relieve colinado alto	8
		Relieve colinado muy alto	15
		Relieve montañoso	31
	POLIGÉNICAS	Coluvio-aluvial antiguo	4
Superficie inclinada disectada		4	
Interfluvio de cimas redondeadas		<1	

Fuente: CTN

En el Cuadro 3.4 se muestran las formaciones geológicas y depósitos superficiales con representación en el cantón, el símbolo utilizado, edad, descripción litológica característica y superficie aproximada que ocupan.

El referente de la información recogida en este cuadro es la cartografía geológica, a escalas 1:100.000 y 1:250.000, proporcionada por el INIGEMM al inicio de este proyecto, en febrero de 2014. Los términos “formación geológica” y “depósito superficial” se utilizan en el sentido que se explica en el apartado 3 (Atributos geológicos: formación geológica y litología) del Anexo IV.

Cuadro 3.4. Formaciones geológicas y depósitos superficiales presentes en el cantón.

FORMACIÓN GEOLÓGICA O DEPÓSITO SUPERFICIAL	SÍMBOLO	EDAD	LITOLOGÍA	km² (aprox.)
Depósitos de ladera (derrumbe)	Q _{dl3}	Cuaternario	Mezcla heterogénea de materiales finos y fragmentos angulares rocosos de muy diverso tamaño	2
Depósitos de ladera (coluvial)	Q _{dl4}	Cuaternario	Mezcla heterogénea de materiales finos y fragmentos angulares rocosos, con ausencia de estratificación y estructuras de ordenamiento interno	24
Depósitos coluvio aluviales	Q _{dca}	Cuaternario	Limo-arcillas, arenas, gravas y bloques	15
Depósitos aluviales	Q _{da}	Cuaternario	Arenas, limos, arcillas y conglomerados	6
Depósitos aluviales (terrazas)	Q _{da8}	Cuaternario	Conglomerado, limo arenoso, arcilla limosa	1
Depósitos fluvio glaciares	Q _{dfg}	Cuaternario	Bloques y gravas en matriz de grano fino, con ocasionales niveles de arenas	3
Depósitos glaciares	Q _{dg}	Cuaternario	Till, tillita. Depósitos pobremente clasificados con ausencia de estratificación y ordenamiento interno, con fragmentos de tamaño bloque empastados en matriz de grano fino	6
Formación Hollín	K _{Ho}	Cretácico	Areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, con escasas intercalaciones de lutitas arenosas	96

Cuadro 3.4. Formaciones geológicas y depósitos superficiales presentes en el cantón (continuación).

FORMACIÓN GEOLÓGICA O DEPÓSITO SUPERFICIAL	SÍMBOLO	EDAD	LITOLOGÍA	km² (aprox.)
Unidad Misahuallí	K _{Mh}	Cretácico	Lavas y piroclastos (basaltos y tobas), con areniscas, lutitas y conglomerados	52
Batolito de Zamora	J _{BZ}	Jurásico	Granitoides	557
Serie Zamora **	Pz _Z	Paleozoico	Granitoides y rocas metamórficas (filitas, cuarcitas, esquistos y gneises)	6
Rocas metamórficas ***	ME	Paleozoico	Rocas metamórficas indiferenciadas	715
Granodiorita ****	IN Gd	Sin asignación de edad	Granodiorita	21

Fuente: CTN, a partir de: cartografías geológicas oficiales 1: 100.000 y 1:250.000 del INIGEMM y organismos predecesores; Bristow y Hoffstetter, 1977.

(*) Nota: Los símbolos empleados para cada una de las formaciones geológicas o depósitos superficiales no tienen carácter oficial, aunque para ello se ha tenido en cuenta la simbología utilizada en publicaciones de amplio reconocimiento y uso: hojas geológicas 1:100.000 y 1:250.000 publicadas por el INIGEMM u organismos predecesores y Léxico estratigráfico del Ecuador (Bristow y Hoffstetter, 1977). Especialmente para depósitos superficiales y otros grupos litológicos que no tienen reconocimiento de formación, así como para ciertas formaciones geológicas, se ha acordado la adopción de códigos propios, siguiendo criterios análogos a los utilizados en dichos trabajos de referencia.

En los códigos, la primera o primeras letras hacen referencia a la edad: Q= Cuaternario, K=Cretácico, J=Jurásico, Pz=Paleozoico, mientras que los subíndices se refieren al tipo de depósito superficial en el caso de los materiales de edad Cuaternario (dl=depósitos de ladera, dca=depósitos coluvio aluviales, dg= depósitos glaciares, etc.) o al nombre de la "formación geológica" (Ho=Hollín, Mh=Misahuallí, Z=Zamora, etc.). Los símbolos que inician su denominación con ME hacen referencia a rocas metamórficas que, en los insumos, carecían de asignación de edad, aunque por su posición y otras características han sido consideradas de forma genérica como pertenecientes al Paleozoico. Los símbolos que inician su denominación con IN se refieren a cuerpos intrusivos sin asignación de edad.

() Nota:** La Serie Zamora, para este cantón, es sustituida por el Batolito de Portachuela (Edad miocénica) según CODIGEM-BGS (1994).

(*) Nota:** En las Rocas metamórficas se pueden hallar Formación Isimanchi, Formación Chiguinda y Formación Sabanilla, según CODIGEM-BGS (1994).

(**) Nota:** La Granodiorita presente en este cantón, está asociada al Batolito de Portachuela (Edad miocénica) según CODIGEM-BGS (1994).

3.5. Descripción de geoformas

A continuación se describen las geoformas presentes en el cantón, de acuerdo a su génesis, señalando las diferencias existentes en cada una dependiendo de su contexto morfológico.

3.5.1. Fluvial

3.5.1.1. Valle fluvial, llanura de inundación (F1)

Dentro del cantón Palanda, existen únicamente cuatro geoformas de este tipo, que se encuentran distribuidas en la zona céntrica y centro-este en tres contextos morfológicos. En el contexto *Vertientes homogéneas* se localiza sobre el cauce del río San Luis o Loyola, en la *Cordillera del Cóndor* sobre los cauces de los ríos Vergel y Panguri y en el contexto *Medio aluvial de Sierra* sobre los cauces de los ríos Valladolid, Blanco y Palanda.

Se desarrollan sobre arenas, limos, arcillas y conglomerados típicos de los depósitos aluviales y se caracterizan por presentar una pendiente muy suave (2 a 5%) y valles con forma plana.



Foto 1. Valle fluvial, llanura de inundación del río Valladolid. Sector Valladolid. 04/02/2015.

3.5.1.2. Valle en V (E1)

Los valles en V están distribuidos a lo largo de toda la superficie estudiada del cantón, están emplazados sobre los cauces de los ríos Numbala, Valladolid, San Francisco, Vergel, Palanda, Punchis y en las quebradas Honda, de la Canela y Agua Dulce, entre otros. Estas geoformas se encuentran dentro de cuatro contextos morfológicos: i) *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; ii) *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; iii) *Medio aluvial de Sierra*; y iv) *Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas.*

Están emplazados sobre diferentes litologías, como la Formación Hollín, la Unidad Misahuallí (CODIGEM-BGS, 1994), el Batolito de Zamora y sobre rocas metamórficas indiferenciadas asociadas a la Unidad Sabanilla y granodioritas del Batolito Portachuela, ambas definidas según el insumo CODIGEM-BGS (1994).

Generalmente estos valles en forma de V presentan pendientes fuertes a muy fuertes (de 40 a 100%) y en algunas ocasiones hasta escarpadas (de 100 a 150%).



Foto 2. Valle en V en el río Numbala sobre el Batolito de Zamora. Sector Sanguinuma. 05/02/2015.

3.5.1.3. Barranco (E2)

Esta geoforma se encuentra repartida por toda la superficie estudiada del cantón, sobre todos los contextos morfológicos descritos, salvo en *Medio aluvial de Sierra*, donde la incisión fluvial ha dado lugar a valles en V.

Tiene similares características que la geoforma anterior. Las pendientes transversales son fuerte a escarpadas (de 40 a 150%), con formas de valle en V y ausencia generalizada de suelos. Se encajan en diferentes litologías, mayoritariamente sobre rocas metamórficas indiferenciadas, en algunos casos se trata de las unidades Sabanilla y Chigüinda (CODIGEM-BGS, 1994), también sobre el Batolito de Zamora y sobre la Formación Hollín. En campo se observa que, bajo esta última formación, generalmente aflora en profundidad la Unidad Misahuallí, caracterizada según CODIGEM-BGS (1994).




Foto 3. Barranco en la Quebrada de Los Muertos. Sector Ventanillas. 04/02/2015.

3.5.1.4. Encañonamiento (E4)

Existen únicamente dos encañonamientos dentro del cantón Palanda, desarrollados sobre los cauces de los ríos Palanuma y Palanda en el extremo sur del cantón, ambos en el límite con el cantón Chinchipe.

Están incluidos dentro de dos contextos morfológicos: sobre los *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas* en el cauce del río Palanuma, se encuentran encajados en rocas metamórficas indiferenciadas caracterizadas como la Unidad Sabanilla según CODIGEM-BGS (1994); y en el *Medio aluvial de Sierra* donde el río Palanda se ha encajado en los granitoides del Batolito de Zamora.

Sus características son pendientes escarpadas (de 100 a 150%), con desniveles de 50 a 100 metros y forma de valle en V. Las vertientes tienen forma rectilínea. La longitud de vertiente varía de 50 a 250 metros en los *Relieves escarpados* y es superior a 500 metros en el *Medio aluvial de Sierra*.



Foto 4. Encañonamiento. Sector San Antonio de Las Juntas. 07/02/2015.

3.5.1.5. Terraza media (Tm)

Se han cartografiado tres terrazas de este tipo, dos están ubicadas en la zona central del cantón, junto a las márgenes del río Valladolid en los sectores de Pueblo Viejo y Finca Nanchina, incluidas dentro del contexto morfológico *Medio aluvial de Sierra*. La otra terraza media se encuentra al noreste de la zona central, en el sector de Loyola junto a la margen derecha del río de mismo nombre, incluida dentro del contexto morfológico *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas*.

Están compuestas por conglomerados, limo arenoso y arcilla limosa, típicos de los depósitos aluviales de terraza. Se caracterizan por presentar una pendiente suave (5 a 12%).

3.5.1.6. Terraza colgada (Tc)

La única terraza colgada existente en este cantón se encuentra en la margen izquierda del río Palanda y sobre ella se sitúa la población de Palanda. Se caracteriza por una pendiente suave (5 a 12%) y está compuesta por depósitos aluviales de terraza.

Está incluida en el contexto morfológico *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*.

3.5.1.7. Vertiente o abrupto de terraza (Tv)

Se trata del abrupto de la terraza anterior (Tc), se localiza al este de la misma, dentro del mismo contexto morfológico. Se caracteriza por un desnivel relativo de entre 100 y 200 metros, tiene una pendiente de media a fuerte (de 25 a 40%) y una vertiente rectilínea de longitud moderadamente larga (de 50 a 250 m).

3.5.2. Laderas

3.5.2.1. Vertiente rectilínea (Lr1)

Esta geoforma se encuentra ubicada en la zona septentrional, colindante al Parque Nacional Podocarpus y en la zona meridional en los sectores de la Cordillera de Calima, la Cordillera de Punchis y al este del río Vergel, principalmente. Está incluida en todos los contextos morfológicos existentes en el cantón, a excepción del *Medio aluvial de Sierra*.

Generalmente presentan una pendiente fuerte (de 40 a 70%), con desniveles relativos mayores a los 100 metros. Las vertientes varían desde largas hasta muy largas (de 250 a más de 500 m).

Se han desarrollado sobre diferentes litologías, en mayor extensión sobre rocas metamórficas indiferenciadas, que en algunos casos se asocian a la Unidad Sabanilla según CODIGEM-BGS (1994). También se desarrollan sobre Granodiorita, la Serie Zamora (asignada según CODIGEM-BGS (1994) al Batolito Portachuela), el Batolito de Zamora, la Unidad Misahuallí y la Formación Hollín.

3.5.2.2. Vertiente rectilínea con fuerte disección (Lr2)

Estas vertientes se encuentran distribuidas por la zona meridional del cantón, en los sectores de Cordillera de Calima, el Contrafuerte del Cerro Negro y entre la Cordillera del Cóndor y el Contrafuerte del Vergel. Están incluidas dentro de los contextos morfológicos: i) *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; ii) *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; y iii) *Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas.*

Estas laderas, de perfil longitudinal marcadamente rectilíneo, presentan una intensa disección, conservando una pendiente de cierta uniformidad a lo largo de las mismas. Aparecen con pendientes fuertes (de 40 a 70%), desniveles relativos de más de 200 metros y longitud de vertiente muy larga (más de 500 m).

Están desarrolladas sobre los granitoides del Batolito de Zamora, rocas metamórficas de la Unidad Sabanilla según CODIGEM-BGS (1994), la Unidad Misahuallí y la Formación Hollín.

3.5.2.3. Vertiente rectilínea con abruptos (Lr4)

Existen únicamente dos vertientes rectilíneas con abruptos en este cantón y están ubicadas en las cordilleras Calima y del Cóndor. Están incluidos dentro de dos contextos morfológicos *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas y Cordillera del Cóndor.*

Son laderas predominantemente rectilíneas, con presencia de una o más zonas de ruptura de pendiente, en las que se crean escalones por un brusco incremento de la pendiente general de la ladera. El motivo principal de estos incrementos de inclinación suele estar ligado a la aparición de litologías más resistentes a la erosión dentro de la misma formación geológica. En este caso se desarrollan sobre los materiales metamórficos de la Unidad Sabanilla, según el insumo CODIGEM-BGS (1994) y la Formación Hollín.

Presentan pendientes fuertes (de 40 a 70%), desniveles relativos superiores a 300 metros y longitudes de vertientes muy larga (más de 500 m).

3.5.2.4. Vertiente abrupta (La1)

Las vertientes abruptas se encuentran distribuidas en la franja occidental y oriental del cantón y algunas en la zona céntrica del mismo. Están incluidas dentro de todos los contextos morfológicos descritos en el cantón excepto en el *Medio aluvial de Sierra*.

Presentan pendientes mayoritariamente muy fuertes (de 70 a 100%) y en el sur de la Cordillera de Sabanillas llegan a ser escarpadas (de 100 a 150%). Los desniveles relativos son, generalmente, mayores de 100 metros, las vertientes tienen longitudes de moderadamente larga a muy larga (de 50 a más de 500 m) y con formas rectilíneas o convexas.

Se desarrollan sobre las rocas metamórficas de las unidades Chigüinda o Sabanilla y de la Formación Isimanchi descritas según CODIGEM-BGS (1994), sobre Granodiorita, la Serie Zamora (correspondiente al Batolito Portachuela según CODIGEM-BGS, 1994), el Batolito de Zamora y la Formación Hollín.



Foto 5. Vertiente abrupta. Sector Cruz del Soldado. 04/02/2015.

3.5.2.5. Vertiente abrupta con fuerte disección (La2)

Se encuentran en menor proporción que la geoforma anterior, pero en las mismas ubicaciones geográficas. Debido a que ocupan menor extensión que las vertientes abruptas (La1) se encuentran únicamente dentro de los contextos morfológicos *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)* y *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*.

Estas se caracterizan por presentan pendientes muy fuertes hasta escarpadas (de 70 a 150%) y generalmente desniveles relativos mayores a los 300 metros y vertientes de longitud muy larga (más de 500 metros), con formas convexas o rectilíneas.

Se disponen sobre diversas litologías definidas según CODIGEM-BGS (1994), como rocas metamórficas de la Formación Isimanchi y de la Unidad Chigüinda, granodioritas ricas en hornblenda del Batolito Portachuela y la Unidad Misahuallí.



Foto 6. Vertiente abrupta con fuerte disección. Sector Loma Paredones. 08/02/2015.

3.5.2.6. Vertiente heterogénea (Lh1)

Estas vertientes son muy abundantes en el cantón y se encuentran distribuidas por toda la superficie del mismo. Están incluidas dentro de todos los contextos morfológicos descritos en el cantón excepto en el *Medio aluvial de Sierra*.

Son laderas de perfil mixto o irregular, que presentan un amplio rango de pendientes (del 12 al 100%), desniveles relativos importantes (en los contextos morfológicos donde tienen mayor presencia, superan a menudo los 200 metros) y vertientes de longitud generalmente larga a muy larga (de 250 a más de 500 m).

Al igual que la mayoría de los tipos de ladera identificados, se presentan sobre una gran variedad de sustratos, como la Formación Hollín, rocas metamórficas de la Formación Isimanchi y de las unidades Sabanilla o Chigüinda (CODIGEM-BGS, 1994), granodioritas ricas en hornblenda del Batolito Portachuela, el Batolito de Zamora, la Unidad Misahuallí y la Formación Napo.



Foto 7. Vertiente heterogénea. Sector Cordillera del Vergel. 06/02/2015.

3.5.2.7. Vertiente heterogénea con fuerte disección (Lh4)

Localizada a lo largo de toda la superficie del cantón de igual manera que las vertientes heterogéneas descritas anteriormente, siendo la geoforma con mayor superficie del cantón. Se encuentra incluido en los contextos morfológicos: i) *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; ii) *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; y iii) *Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas.*

Se caracteriza por presentar pendientes de media a fuerte a muy fuerte (de 25 a 100%), desniveles relativos generalmente mayores de 200 metros y vertientes muy largas (más de 500 m) con formas irregulares o mixtas. Están desarrolladas en las mismas litologías que las vertientes heterogéneas (Lh1).



Foto 8. Vertiente heterogénea con fuerte disección. Sector Numbala. 05/02/2015.

3.5.2.8. Escarpe de deslizamiento (Lh6)

El único escarpe de deslizamiento cartografiado en el cantón se encuentra ubicado al norte de la quebrada Yambanamá que nace de la Cordillera de Calima, en el suroeste de la zona central del cantón. Esta geoforma está incluida en el contexto morfológico *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*.

Está desarrollado sobre rocas metamórficas indiferenciadas, presenta una pendiente muy fuerte (70 a 100%) y un desnivel relativo de entre 200 y 300 metros. La vertiente tiene una longitud moderadamente larga con forma rectilínea.

3.5.2.9. Coluvión antiguo (Col2)

Los coluviones se encuentran desarrollados mayoritariamente a lo largo de la franja central norte-sur y de la franja oriental del cantón, aunque en menor proporción se encuentran en los sectores de río Negro y río Quingos en el occidente.

Están incluidos dentro de los contextos morfológicos: i) *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; ii) *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; y iii) *Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas.*

Las morfologías típicas de estas geoformas responden a perfiles de ladera cóncava, convexa, rectilínea, mixta o irregular, con pendientes de media a fuerte (de 12 a 70%), con desniveles muy variables, de 5 a más 300 metros y longitudes de vertiente que superan los 50 metros.

Están formados por material textural y composicionalmente heterogéneo, en que predominan fragmentos de carácter angular y subangular englobados en una matriz arenosa o limosa, escasamente clasificados y sin estratificación.



Foto 9. Coluvión antiguo. Vista general en el Sector Río Loyola. 08/02/2015.

3.5.2.10. Depósitos de deslizamiento, masa deslizada (Ld1)

Los depósitos de deslizamiento corresponden a las masas de roca y suelo producidas por inestabilidades gravitatorias, situadas al pie de los correspondientes escarpes de deslizamiento (Lh6).

Estos depósitos se sitúan en la zona central y sur del cantón, en los sectores de Huambuco, Valle Hermoso, Loma de Chipica y Borleros y en la zona suroriental en los sectores San Juan de Punchis y en el Contrafuerte del Vergel. Están compuestos por materiales finos de alteración y meteorización de las laderas y por fragmentos angulares rocosos de las formaciones de las que proceden, principalmente rocas metamórficas de la Unidad Sabanilla (CODIGEM-BGS, 1994) y los granitoides del Batolito de Zamora.

Se encuentran dentro de los contextos morfológicos *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)* y *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*.

Las pendientes de estos depósitos presentan gran variabilidad (de 12 a 70%), con desniveles generalmente mayores de 100 metros y vertientes con longitud larga a muy larga (de 250 a más de 500 m), en gran parte derivados de la magnitud del movimiento. La forma de la vertiente de estos depósitos puede ser cóncava, convexa, irregular, mixta o rectilínea.

3.5.3. Glaciar y periglaciar

3.5.3.1. Circo glaciar (Gf1)

Los circos glaciares se encuentran ubicados en la zona occidental del cantón, en el límite con el cantón Loja, sobre la Cordillera de Sabanilla. Se encuentran incluidos en el contexto morfológico de *Paisajes glaciares*.

Están desarrollados sobre rocas metamórficas de la Unidad Chigüinda y el Batolito de Portachuela según el insumo CODIGEM-BGS (1994). Se caracterizan por presentar una pendiente fuerte a muy fuerte (de 40 a 100%), con desniveles relativos de entre 50 a más de 300 metros. Presentan vertientes con longitudes moderadamente largas hasta muy largas, con formas cóncavas o mixtas.

3.5.3.2. Cubeta glaciar (Gf2)

Estas geoformas se desarrollan junto a varias de las geoformas anteriores, por tanto ocupan la misma ubicación geográfica y contexto morfológico.

En general se trata de cubetas glaciares antiguas sin presencia de lámina de agua. Están compuestas por depósitos pobremente clasificados con ausencia de estratificación y ordenamiento interno, con fragmentos de tamaño bloque empastados en matriz de grano fino, característicos de los depósitos glaciares (till).

Se caracterizan por presentar una pendiente de plana (de 0 a 2%) o de suave a media (de 5 a 25%), con desniveles relativos de 5 a 25 metros. Las vertientes son de cortas a moderadamente largas (de 15 a 250 m) con formas cóncavas.

3.5.3.3. Fondo de valle glaciar (Gf3)

Al igual que las geoformas anteriores, se encuentra en la zona occidental del cantón, sobre valles de la Cordillera de Sabanilla y se encuentran incluidos dentro del contexto morfológico *Paisajes glaciares*.

Se caracterizan por una pendiente de media hasta media a fuerte (de 12% a 40%) y formas de valle en U o planas. Están compuestos por depósitos glaciares (till).

3.5.3.4. Vertiente de valle glaciar (Gf4)

De la misma manera que las geoformas glaciares anteriores, las vertientes de valle glaciar se encuentran sobre la Cordillera de Sabanilla, en la zona occidental del cantón. Forman parte del contexto morfológico *Paisajes glaciares*.

Se han desarrollado, según el insumo CODIGEM-BGS (1994), sobre la Unidad Chigüinda y el Batolito de Portachuela. Se caracterizan por pendientes fuertes a muy fuertes (de 40 a 100%), desniveles relativos comprendidos entre 100 y 300 metros y vertientes de longitud larga a muy larga (de 250 a más de 500 m) con formas rectilíneas, irregulares o mixtas.

3.5.3.5. Depósito glaciar modelado por acción fluvial (Gd6)

Esta geoforma se encuentra rellenando valles y quebradas de la Cordillera de Sabanilla, en la zona occidental del cantón, ocupando en conjunto unos 3 km². Se encuentran incluidas dentro de los contextos morfológicos *Paisajes glaciares* y *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas*.

Están formados por depósitos fluvio glaciares, compuestos por bloques y gravas en matriz de grano fino, con ocasionales niveles de arenas. Presentan pendientes media a fuerte (de 25 a 40%) y formas de valle planas.

3.5.4. Volcánico

3.5.4.1. Relieve volcánico colinado medio (Rv9)

Los relieves volcánicos colinados medios identificados en este cantón se encuentran en el sureste del cantón, en la parte occidental de la Cordillera del Cóndor. Se trata de dos superficies de aproximadamente 1 km², ambas incluidas dentro del contexto morfológico *Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas*.

La litología observada en campo se define como Unidad Misahuallí según CODIGEM-BGS (1994), compuesta por lavas y piroclastos (basaltos y tobas), con areniscas, lutitas y conglomerados.

El relieve se caracteriza por presentar una pendiente fuerte (de 40 a 70%) y un desnivel relativo, característico de esta geoforma, de 50 a 100 metros. Las vertientes que presenta son moderadamente largas (de 50 a 250 m) y presentan formas rectilíneas o irregulares. Los valles son en forma de V y las cimas con forma redondeada.

3.5.4.2. Relieve volcánico colinado muy alto (Rv10)

Se encuentra en la misma ubicación geográfica de la geoforma anterior (Rv9), incluido dentro del mismo contexto morfológico. Se ha formado sobre la Unidad Misahuallí, según CODIGEM-BGS (1994).

Sus características son una pendiente muy fuerte (de 70 a 100%), con un desnivel relativo de entre 200 a 300 metros característico de este tipo de relieve. Las vertientes que presenta tienen longitud mayor a los 500 metros, con forma rectilínea, los valles son en forma de V y la cimas con forma redondeada.

3.5.5. Estructural

3.5.5.1. Superficie de mesa o meseta disectada (Eh2)

Únicamente se ha cartografiado una geoforma de este tipo dentro del cantón, se encuentra ubicada al sureste del mismo, en el inicio del río Vergel, cerca del límite con Perú. Está incluida dentro del contexto morfológico *Cordillera del Cóndor* y se desarrolla sobre areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, con escasas intercalaciones de lutitas arenosas de la Formación Hollín.

Esta superficie de mesa muestra un cierto grado de incisión por la escorrentía superficial concentrada, lo que origina unas pendientes algo más elevadas (de 25 a 40%). Estas incisiones presentan un desnivel relativo que oscila entre 25 y 50 metros, con longitudes de vertiente moderadamente largas (de 50 a 250 m), forma de vertiente rectilínea, valles planos y formas de valle en V.

3.5.5.2. Cornisa de mesa o meseta (Eh3)

Las cornisas de mesa o meseta, están ubicadas en la parte norte y sur de la geoforma descrita anteriormente de Superficie de mesa o meseta disectada (Eh2). Se encuentran en el mismo contexto morfológico y ubicación geográfica y están compuestas por la misma litología de la Formación Hollín.

Estas cornisas presentan unas pendientes escarpadas (de 100 a 150%) y unos desniveles entre 100 a 200 metros. Las vertientes de estas cornisas son rectilíneas y tienen una longitud larga (de 250 a 500 m).

3.5.5.3. Vertiente de mesa o meseta (Eh4)

La única geoforma de este tipo se encuentra rodeando las geoformas descritas anteriormente (Eh2) y (Eh3), compuesta por la litología de la Formación Hollín, en la misma ubicación geográfica y dentro del mismo contexto morfológico.

Se caracteriza por presentar una pendiente muy fuerte (de 70 a 100%), el desnivel relativo varía entre 100 y 200 metros. Las vertientes presentan una forma irregular y una longitud larga, de entre 250 a 500 metros.

3.5.5.4. Superficie de cuesta (Ei1)

Esta geoforma se encuentra ubicada en el extremo oriental, en el límite con Perú. Son dos superficies, incluidas dentro del contexto morfológico *Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas.*

Su composición litológica se trata de areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, con escasas intercalaciones de lutitas arenosas, pertenecientes a la Formación Hollín.

Las superficies de cuesta se caracterizan por presentar una pendiente media (de 12 a 25%) y unos desniveles relativos que varían desde los 50 a los 200 metros. Estas superficies presentan una morfología irregular y una longitud de vertiente mayor a 500 metros.

3.5.5.5. Superficie de cuesta disectada (Ei2)

Esta geoforma se encuentra ubicada al este, en el límite con el cantón Nangaritza con el cual comparte su ubicación. Está incluida dentro del contexto morfológico *Cordillera del Cóndor* y su litología está compuesta por la Formación Hollín.

Esta superficie tiene un mayor grado de disección, presentando incisiones que dan lugar a pequeños valles en forma de V y desniveles de sus paredes laterales de entre 5 y 15 metros. La longitud de las vertientes es moderadamente larga (de 50 a 250 m), con forma irregular y la pendiente es media (de 12 a 25%).

3.5.5.6. Frente de cuesta (Ei3)

Esta geoforma es el abrupto que constituye el límite de las dos últimas geoformas descritas: superficie de cuesta (Ei1) y superficie de cuesta disectada (Ei2). Se localiza en el mismo contexto morfológico y con la misma composición litológica.

Se trata de frentes extensos, que presentan pendientes fuertes (40 a 70%), con desniveles relativos que varían entre 100 y más de 300 metros. La longitud de la vertiente puede ser moderadamente larga con forma rectilínea y muy larga con forma irregular.

3.5.5.7. Vertiente de cuesta (Ei4)

Esta geoforma se encuentra ubicada al oeste de las geoformas descritas anteriormente (Ei2, Ei3) y tiene su mismo contexto morfológico, como igual composición litológica y ubicación geográfica.

Las pendientes varían desde media a fuerte (de 12 a 70%), el desnivel relativo es mayor a los 100 metros. Las vertientes presentan una longitud superior a los 500 metros y tiene formas irregulares.

3.5.5.8. Superficie de chevron (Ei5)

Se diferencian varias superficies de chevron ubicadas al sureste del cantón, junto a las márgenes del río Vergel, en el tramo que queda al este del Contrafuerte del Vergel. Se encuentran incluidas dentro del contexto morfológico *Cordillera del Cóndor*.

Estas superficies se desarrollan sobre las areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, con escasas intercalaciones de lutitas arenosas, pertenecientes a la Formación Hollín. Se caracterizan por presentar pendientes fuertes y un desnivel relativo muy variable (de 50 a más de 300 m). Sus laderas presentan una longitud de moderadamente larga a muy larga (de 50 a más de 500 m) y formas rectilíneas.

3.5.5.9. Frente de chevron (Ei6)

Constituyen el abrupto de las superficies de chevron anteriores (Ei5), formados por los mismos materiales que éstas. Sus pendientes varían entre fuertes a escarpadas (de 40 a 150%) y dan lugar a formas de vertiente rectilíneas con longitudes cortas a moderadamente largas (de 15 a 250 m).

Al igual que las superficies de chevron (Ei5), los frentes se encuentran en el contexto morfológico *Cordillera del Cóndor* y están desarrollados sobre las areniscas cuarzosas de la Formación Hollín.

3.5.5.10. Vertiente de chevron (Ei7)

Esta geoforma se sitúa inmediatamente por debajo de los frentes de chevron o, en caso de que éstos no sean representables, se identifican bajo las propias superficies de chevron. Se emplazan en la margen izquierda del río Vergel, en el mismo contexto morfológico que las geoformas anteriores (Ei5, Ei6).

Presentan una pendiente fuerte (40 a 70%), con un desnivel relativo de entre 25 a 100 metros. Las laderas presentan longitud moderadamente larga con forma mixta o cóncava.

3.5.5.11. Barra o cresta estructural (Esv)

Se encuentra ubicada al sureste del cantón, a ambos lados de río Vergel, en el paso del Contrafuerte del Cerro Negro al Contrafuerte del Vergel. Están incluidas dentro del contexto morfológico *Cordillera del Cóndor*.

Las barras o crestas estructurales están desarrolladas mayoritariamente sobre las areniscas cuarzosas de la Formación Hollín y en la zona más septentrional sobre las lavas y piroclastos de la Unidad Misahuallí.

Estas geoformas presentan una pendiente escarpada (de 100 a 150%), con un desnivel relativo muy variable, de 5 a 100 metros. Las longitudes de vertientes tienden a ser moderadamente largas (de 50 a 250 m), aunque también presentan longitudes cortas (de 15 a 50 m) y la forma de vertiente es rectilínea.

3.5.5.12. Restos de superficie estructural (Esr)

Las geoformas de este tipo se encuentran ubicadas en la zona sureste del cantón, en el este de los Contrafuertes Vergel y Cerro Negro. Están incluidas dentro del contexto morfológico *Cordillera del Cóndor* y mayoritariamente desarrolladas sobre la Formación Hollín, aunque las geoformas más cercanas a la Cordillera del Cóndor se desarrollan sobre litología de la Formación Misahuallí.

Estas geoformas tienen una pendiente de media a fuerte hasta fuerte (de 25 a 70%) y un desnivel relativo de más de 100 metros. Las vertientes presentan longitudes principalmente muy largas (más de 500 m), aunque cerca de la Cordillera del Cóndor se dan longitudes moderadamente largas (de 50 a 250 m), las formas de vertiente son rectilíneas, mixtas o irregulares.

3.5.6. Tectónico-erosivo

3.5.6.1. Relieve colinado medio (Rt4)

Estos relieves se encuentran distribuidos por el cantón, principalmente en la franja central de norte a sur, en cinco ubicaciones puntuales en los sectores de El Porvenir, Numbala, San Juan de Punchis y en la unión de los ríos Punchis y de La Peña dentro del contexto morfológico *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas*, formados sobre el Batolito de Zamora. También se localiza en la zona oeste del cantón, en la unión de los ríos Blanco y Negro dentro del contexto *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas*, formado sobre las rocas metamórficas de la Unidad Chigüinda (CODIGEM-BGS, 1994).

Presentan un desnivel característico de la geoforma de 50 a 100 metros. La pendiente va desde media a fuerte (de 12 a 70%), y las vertientes tienen longitudes de moderadamente larga a larga (de 50 a 500 metros), con formas mixtas, irregulares o rectilíneas. Las cimas de los relieves tienden a ser redondeadas, aunque también se dan formas agudas y los valles tienen forma de V.

3.5.6.2. Relieve colinado alto (Rt5)

Los relieves de este tipo se encuentran distribuidos por todo el cantón, principalmente a lo largo de la franja central, la zona oriental. Estos se encuentran incluidos en los contextos morfológicos i) *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; ii) *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; y iii) *Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas.*

Son relieves con un desnivel relativo característico para esta geoforma, que va de 100 a 200 metros. Presentan pendientes de media a fuerte hasta muy fuerte (de 25 a 100%), las vertientes tienen longitudes desde moderadamente largas hasta muy largas (50 a más de 500 m) con formas rectilíneas, irregulares o mixtas. Los valles son en forma de V y las cimas son agudas o redondeadas.




Foto 10. Relieve colinado alto. Sector La Canela. 06/02/2015.

3.5.6.3. Relieve colinado muy alto (Rt6)

Estos relieves están situados a lo largo de toda la superficie del cantón, incluidos dentro de los mismos contextos morfológicos de los relieves colinados altos (Rt5). Se desarrollan generalmente sobre las litologías del Batolito de Zamora, sin embargo, en el contexto *Relieves escarpados* se forman estos relieves sobre rocas metamórficas pertenecientes, según el insumo CODIGEM-BGS (1994), a las unidades Isimanchi, Sabanilla y Chigüinda.

El desnivel relativo característico de estos relieves es de 200 a 300 metros. Presentan una pendiente entre media a fuerte a muy fuerte (de 25% a 100%). Las vertientes de estos relieves superan los 250 metros de longitud y sus formas son mixtas, irregulares o rectilíneas. Las cimas de estos relieves son agudas o redondeadas y generan valles en V.



Foto 11. Relieve colinado muy alto. Sector Santa Clara del Vergel. 07/02/2015.

3.5.6.4. Relieve montañoso (Rt7)

Este relieve ocupa una gran superficie dentro del cantón. Se encuentra distribuido principalmente a lo largo de toda la franja central, parte de la zona oriental y occidental. Están incluidos dentro de los contextos morfológicos: i) *Paisajes glaciares*; ii) *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; iii) *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; y iv) *Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas.*

Presenta un desnivel relativo superior a los 300 m, con pendientes medias a fuertes, hasta escarpadas (de 25 a 150%), vertientes mixtas, irregulares o rectilíneas que tienen una longitud generalmente mayor a los 500 metros. Las cimas tienen forma tanto aguda como redondeada y los valles forma de V.



Foto 12. Relieve montañoso. Sector Palanda. 05/02/2015.

3.5.7. Poligénicas

3.5.7.1. Coluvio-aluvial reciente (Coa1)

El único coluvio-aluvial de este tipo se encuentra ubicado al sur del cantón, en el sector de San Juan de Punchis, sobre el cauce del río de Las Peñas. Este está incluido dentro del contexto morfológico *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*.

Son depósitos de transición entre las laderas y los valles, que rellenan vaguadas y fondos de pequeños drenajes, cuyos materiales proceden tanto de la ladera como de una restringida dinámica fluvial. Su litología corresponde a limo-arcillas, arenas, gravas y bloques. Presenta una pendiente media y en un valles con forma de V.

3.5.7.2. Coluvio-aluvial antiguo (Coa2)

Se encuentran distribuidos a lo largo de toda la superficie del cantón, con un desarrollo mayoritario en la zona centro-este, desde los sectores El Porvenir hasta Santa Clara del Vergel. Se encuentran incluidos dentro de tres contextos morfológicos: i) *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; ii) *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; y iii) *Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas.*

De características muy similares a las de la anterior geoforma, se les considera antiguos ya que presentan un cierto grado de disección y sobre ellos aparece una vegetación pionera bien desarrollada. Están formados por depósitos coluvio aluviales compuestos por limo-arcillas, arenas, gravas y bloques. Presentan pendientes suaves hasta medias a fuertes (de 5 a 40%) y formas de valle tanto planas como en V y en algún caso con forma de U.



Foto 13. Coluvio-aluvial antiguo en el río Nanchina. Sector Finca Nanchina. 04/02/2015.

3.5.7.3. Superficie inclinada disectada (Si3)

Se han cartografiado en este cantón tres superficies inclinadas disectadas, las cuales se definen como superficies de perfil longitudinal rectilíneo y cierta inclinación, de origen incierto o de difícil adscripción genética, en que la escorrentía superficial se muestra concentrada y se aprecia un grado de incisión de moderado a fuerte. Dos de las tres se encuentran ubicadas al sureste del cantón, entre el Contrafuerte del Vergel y la Cordillera del Cóndor, incluida dentro del contexto *Cordillera del Cóndor* y una tercera se encuentra al suroeste del cantón, sobre la Cordillera de Calima, incluida dentro del contexto morfológico *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*.

Estas superficies se desarrollan sobre diversas litologías, que suelen ser responsables de la formación de la geoforma al ser alternancia de marcado carácter diferencial. En los *Relieves escarpados* se encuentran sobre rocas metamórficas asociadas a la Unidad Sabanilla (CODIGEM-BGS, 1994); en la *Cordillera del Cóndor* se presentan sobre las areniscas cuarzosas de la Formación Hollín y sobre las lavas de la Unidad Misahuallí. En general presentan una pendiente media (de 12 a 25%). Las disecciones se caracterizan por laderas rectilíneas con longitud moderadamente larga y un desnivel relativo de 5 a 50 metros.

3.5.7.4. Interfluvio de cimas redondeadas (Ar1)

Esta geoforma se encuentra ubicada en la zona meridional del cantón, principalmente sobre la Cordillera de Calima y el Contrafuerte del Vergel. Se encuentra incluida dentro de tres contextos morfológicos: i) *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; ii) *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)*; y iii) *Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas.*

Se trata de una geoforma de desarrollo lineal y estrecho, con perfil transversal redondeado, que ocupa las posiciones cimaras del relieve, de donde arrancan los diferentes tipos de ladera o vertientes.

Se desarrollan sobre los granitoides del Batolito de Zamora y rocas metamórficas de la Unidad Sabanilla (CODIGEM-BGS, 1994), las cuales suelen estar compuestas por materiales blandos y/o meteorizados que provocan que las cimas sean de morfologías suaves aunque con pendientes fuertes (de 40 a 70%) a cada lado del eje transversal.



Foto 14. Interfluvio de cimas redondeadas. Sector Loma Huayracruz. 08/02/2015.

3.5.7.5. Interfluvio de cimas estrechas (Ar2)

Estos interfluvios se encuentran distribuidos mayoritariamente al este del cantón, en la Cordillera de Sabanilla, al norte de ésta y también en la zona central, sobre la Cordillera de Numbala y en el suroeste del cantón, sobre la Cordillera de Calima. Se encuentra dentro de los contextos morfológicos *Paisajes glaciares* y *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas*.

Están desarrollados sobre diferentes litologías, caracterizadas según el insumo CODIGEM-BGS (1994), como las unidades Sabanilla y Chigüinda y el Batolito de Portachuela. Se caracterizan por pendientes de media a fuerte hasta fuertes (de 25 a 70%) y cimas con forma aguda.

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Territorialmente el cantón Palanda tiene 2.042 km² aproximadamente, de los cuales el presente estudio geomorfológico contempla 1.503 km² ya que las restantes pertenecen al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (Parque Nacional Yacuri, Parque Nacional Podocarpus y Reserva Biológica Cerro Plateado). Está situado principalmente en la región Sierra, aunque incluye una pequeña porción de región Amazonía, del orden del 16% del territorio estudiado. Presenta alturas sobre el nivel del mar que varían desde 800 metros hasta un máximo de 3.600 metros.

En el cantón Palanda se pueden diferenciar cuatro dominios fisiográficos, los tres primeros enmarcados en la región Sierra y el último en la región Amazonía.

1. **Cimas frías de las Cordilleras Occidental y Real.** Este dominio presenta la menor extensión dentro de la región Sierra. Ocupa una superficie en el territorio estudiado de aproximadamente 35 km², ocupando un pequeño apéndice situado en la zona noroccidental del área de estudio. Este dominio fisiográfico contiene, en el territorio estudiado, un solo contexto morfológico, denominado *Paisajes glaciares*.

Las geoformas más abundantes en dicho contexto son las relacionadas con el modelado glaciar y periglaciar, especialmente circos glaciares, fondos y vertientes de valle glaciar y depósitos glaciares modelados por acción fluvial. Se han identificado diferentes tipos de laderas, como rectilínea, abrupta y heterogénea, una notable extensión dentro de la geoforma poligénica Interfluvios de cimas estrechas y dentro del grupo genético tectónico-erosivo, la geoforma Relieve montañoso. Las geoformas fluviales están representadas únicamente por barrancos.

2. **Vertientes externas de la Cordillera Real.** Es el dominio fisiográfico más extenso del cantón, ocupando casi un 81% del total del territorio analizado, unos 1216 km². Este dominio fisiográfico, que se desarrolla principalmente sobre rocas metamórficas y cuerpos intrusivos, ha sido modelado por erosión hídrica de carácter lineal. En el territorio estudiado del cantón, presenta dos contextos morfológicos.

El contexto *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)* ocupa una superficie de 510 km² en la zona oriental del cantón. El modelado más representativo es el tectónico-erosivo, donde se encuentran relieves montañosos, que ocupan una superficie de más del 45% del área del contexto y relieves colinados de distintos desniveles. También se encuentran diferentes tipos de laderas, ocupando casi un tercio del contexto y coluviones antiguos o depósitos de deslizamiento asociados a ellas. Las geoformas de génesis fluvial forman una densa red de drenaje en el contexto, los barrancos son la geoforma más abundante y se encuentran también valles en V y valles fluviales, así como depósitos asociados, como terrazas medias y colgadas con sus vertientes o abruptos.

El contexto *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)* presenta una extensión de 705 km² en la zona occidental y central del cantón, siendo el contexto con mayor superficie estudiada. Las geoformas más abundantes en dicho contexto son las relacionadas con el modelado de laderas, especialmente el tipo de vertientes heterogénea, con y sin disección. Las geoformas fluviales están representadas por geoformas erosivas, como barrancos, valles en V y encañonamientos. Se identifican depósitos glaciares modelados por acción fluvial y se encuentran también diferentes geoformas poligénicas: coluvio-aluviales antiguos e interfluvios de cimas estrechas y redondeadas, principalmente. También se han reconocido, dentro del grupo genético tectónico-erosivo, la geoforma Relieve montañoso, con mayor extensión, y diferentes relieves colinados.

3. **Medio aluvial de Sierra.** Este dominio se corresponde con el contexto morfológico homónimo, ya que no presenta ninguna otra subdivisión, que presenta una escasa extensión, aproximadamente 9 km². Todas sus geoformas son de génesis fluvial y están asociadas a los sistemas fluviales de los ríos Palanda, Numbala, Valladolid, Vergel y Blanco. Las geoformas identificadas son: Valle fluvial-Ilanura de inundación, Valle en V, encañonamiento y Terraza baja.
4. **Zona Subandina.** Este dominio fisiográfico ocupa unos 244 km² en la franja oriental del cantón. Se trata de un territorio integrado por relieves montañosos o submontañosos. En el cantón, este dominio incluye solamente un contexto morfológico, denominado *Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas.*

En este contexto morfológico el modelado de laderas es el más característico, da forma a más del 50% del contexto, principalmente con vertientes heterogéneas, con y sin disección, y vertientes abruptas y rectilíneas con diferentes características; se encuentran también coluviones antiguos asociados a las laderas. El modelado estructural tiene también un papel destacado en este contexto, con la presencia de cuestras, chevrones, mesas y restos de superficies estructurales. El grupo genético fluvial está, sobre todo, representado por barrancos, aunque también se han descrito valles en V y fluviales. Las formas poligénicas, como superficies inclinadas disectadas, coluvio-aluvial antiguo e interfluvio de cimas redondeadas, al igual que las desarrolladas sobre sustratos volcánicos antiguos (relieves volcánicos colinados), aparecen en muy escasa extensión. Sin embargo, los relieves colinados altos, muy altos y especialmente los relieves montañosos, pertenecientes al modelado tectónico-erosivo, tienen una considerable representación en el conjunto de este contexto morfológico.

El cantón Palanda presenta en general un relieve muy montañoso, con grandes vertientes en las que se encaja fuertemente la red de drenaje y se forma una importante variación de alturas dentro del cantón, desde los 3.600 msnm en las cordilleras de la zona noroccidental, hasta los 800 msnm en las zonas más bajas de los ríos Palanda y Vergel al sur. Dentro del cantón puede observarse una diferencia clara en las dos mitades del mismo. La mitad occidental presenta mayores alturas (en el contexto *Paisajes glaciares*) y está ocupado, casi por completo, por los *Relieves escarpados*. La mitad oriental se encuentra, en general, a menor altura y presenta una red de drenaje más densa. Estas diferencias se deben al levantamiento de la mitad occidental mediante la falla de Palanda, que atraviesa el cantón de norte a sur, y sobre la que se encaja el cauce del río Palanda.

La división que crea la falla de Palanda también queda implícita en la distribución de los contextos y en las litologías del cantón. Al oeste de la falla se encuentra el contexto *Relieves escarpados sobre rocas metamórficas*, que presenta multitud de vertientes desarrolladas mayoritariamente sobre rocas metamórficas indiferenciadas del Paleozoico, en algunos casos correspondientes a la Unidad Sabanilla según CODIGEM-BGS (1994); en las zonas más occidentales del cantón se puede observar el contacto con el cuerpo intrusivo formado por el Batolito de Portachuela. Al este de la falla de Palanda se encuentran los granitoides del Batolito de Zamora formando el contexto *Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas*, aunque se observa un relicto de las rocas metamórficas paleozoicas en medio de este contexto. Sobre estas litologías se encajan los ríos más representativos del cantón, con un trazado meandriforme y se generan grandes superficies de relieves colinados con diversas alturas. En el borde más oriental del cantón se observan diversas litologías y geoformas que se engloban en el contexto *Cordillera del Cóndor*, separadas de los anteriores por la falla La Canela. En esta zona se localizan geoformas de laderas y estructurales principalmente, sobre la Formación Hollín, la Unidad Misahuallí y el Batolito de Zamora.

V. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Referencias generales

Clapperton, C.M., 1993. Quaternary Geology and Geomorphology of South America. *Elsevier*. Ámsterdam, 779 p.

Colombo, F., y Martí, J., 1992. Depósitos volcano-sedimentarios. En: Sedimentología, colección Nuevas tendencias. *Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)*. Madrid, 271-345.

CLIRSEN, 1998. Estudio geomorfológico del cantón Guayaquil. *Informe no publicado*. Quito, 34 p.

CLIRSEN, 2012. Proyecto: "Generación de Geoinformación para la gestión del territorio a nivel nacional, escala 1:25.000". Geomorfología. Metodología (versión 2012). *Informe no publicado*. Quito, 36 p.

Coltorti, M., y Ollier, C.D., 2000. Geomorphic and tectonic evolution of the Ecuadorian Andes. *Geomorphology*, 32, 1-19.

Duque, P., 2000. Léxico Estratigráfico del Ecuador. *CODIGEM*. Quito, 102 p.

Gutiérrez, M., 2008. Geomorfología. *Pearson Educación, S.A.* Madrid, 898 p.

IEE, 2013. Base conceptual de la cartografía geomorfológica y de amenaza por tipo de movimiento en masa. *Informe no publicado*. Quito, 114 p.

Iriondo, M.H., 2012. Cuaternario de Ecuador, Perú y Chile. *Museo Provincial de Ciencias Naturales*. Santa Fe, 416 p.

Leopold, L. B., 1994. A View of the River. *Harvard University Press*. Cambridge, Massachusetts, 298 p.

Ministerio de Medio Ambiente, 2006. Guía para la elaboración de estudios del medio físico. *Serie Monografías, Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente*. Madrid, 917 p.

Reading, A. J., Thompson, R. D., y Millington, A.C., 1995. Humid Tropical Environments. *Blacwell*. Oxford, 429 p.

Rossiter, D., 2000. Metodologías para el levantamiento del recurso suelo: texto base. (trad. R. Vargas 2004). *ITC, Soil Science Division*. Netherlands, s.p.

Strahler, A. N., 1979. Geografía Física. *Ediciones Omega* (4ª edición). Barcelona, 767 p.

Van Zuidam, R.A., 1985. Aerial photo-interpretation in terrain analysis and geomorphologic mapping. *Printed Smith Publishers*. Netherlands, 442 p.

Vera, R., 2013. Geology of Ecuador. *Gráficas Iberia*. Quito, 150 p.

Zinck, J.A., 2012. Geopedología. *ITC*. Enschede, Netherlands, 123 p.

5.2. Bibliografía citada

Bristow, C.R., y Hoffstetter, R., 1977. Lexique Stratigraphique International, vol. V. Amérique Latine, Fasc. 5 a 2: Ecuador. *Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)*. París, 410 p.

CODIGEM-BGS (Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico-Minera-Metalúrgica; British Geological Survey), 1994. Geological and metal occurrence maps of the Cordillera Real Metamorphic Belt, Ecuador, esc. 1:500.000. (Publicado en 2 hojas). *CODIGEM*. Quito.

CODIGEM-BGS (Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico-Minero-Metalúrgica; British Geological Survey), 1993. Mapa Geológico del Ecuador, esc. 1:1.000.000. *CODIGEM*. Quito.

DGGM-INEMIN (Dirección General de Geología y Minas; Instituto Ecuatoriano de Minería), 1987. Mapa Geológico de la Provincia de Palanda Santiago, esc. 1:250.000. *DGGM*. Quito.

DGGM-UK (Dirección General de Geología y Minas; Misión Británica), 1975. Hoja Geológica: Alausí (Hoja 71), esc. 1:100.000. *DGGM*. Quito.


DGGM-UK (Dirección General de Geología y Minas; Misión Británica), 1975. Hoja Geológica: Cañar (Hoja 72), esc. 1:100.000. *DGGM*. Quito.

DGGM-IGS (Dirección General de Geología y Minas; Institute of Geological Sciences), 1982. Mapa Geológico del Ecuador, esc. 1:1.000.000. *DGGM*. Quito.

Winckell, A. (coordinador), 1997. Los paisajes naturales del Ecuador: las regiones y paisajes del Ecuador. *CEDIG, IPGH, ORSTOM, IGM*. Quito, 416 p. + mapa esc. 1:1.000.000.

ANEXO I. MODELO DE FICHA DE CAMPO

Tracasa Ecuador. Formulario de Ficha


LEVANTAMIENTO DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA ESCALA 1:25.000
Ficha General de Información de Campo - Geomorfología

1. Datos Generales

Identificación

Código Ficha Fecha descripción

Código Salida Código Responsable Número Ficha

Coordenadas

Longitud:

Latitud:

Altitud:

Ubicación

PROVINCIA

CANTON

PARROQUIA

2. Descripción

Contexto Morfológico

Geoforma Pendiente

Forma Cima Desnivel Relativo

Forma Vertiente Longitud Vertiente

Forma Valle Formación

Litología

Descripción Litología

A. Fotos Descripción Geoforma

3. Macizo Rocoso

Macizo Rocoso 1

Estructura Macizo Rocoso <input type="text"/>	Humedad <input type="text"/>	Número Muestras <input type="text"/>	Categorización Roca
Grado Fracturación <input type="text"/>	Tipo Discontinuidad <input type="text"/>	Buzamiento <input type="text"/>	Clasificación <input type="text"/>
Grado Meteorización <input type="text"/>	Espacio entre Discontinuidades <input type="text"/>	Azimuth <input type="text"/>	Tipo <input type="text"/>
Grado Compactación <input type="text"/>	Abertura entre Discontinuidades <input type="text"/>	Profundidad <input type="text"/>	Textura <input type="text"/>
Afloramiento Agua <input type="text"/>	Material Relleno <input type="text"/>		

Macizo Rocoso 2

Estructura Macizo Rocoso <input type="text"/>	Humedad <input type="text"/>	Número Muestras <input type="text"/>	Categorización Roca
Grado Fracturación <input type="text"/>	Tipo Discontinuidad <input type="text"/>	Buzamiento <input type="text"/>	Clasificación <input type="text"/>
Grado Meteorización <input type="text"/>	Espacio entre Discontinuidades <input type="text"/>	Azimuth <input type="text"/>	Tipo <input type="text"/>
Grado Compactación <input type="text"/>	Abertura entre Discontinuidades <input type="text"/>	Profundidad <input type="text"/>	Textura <input type="text"/>
Afloramiento Agua <input type="text"/>	Material Relleno <input type="text"/>		

Macizo Rocoso 3

Estructura Macizo Rocoso <input type="text"/>	Humedad <input type="text"/>	Número Muestras <input type="text"/>	Categorización Roca
Grado Fracturación <input type="text"/>	Tipo Discontinuidad <input type="text"/>	Buzamiento <input type="text"/>	Clasificación <input type="text"/>
Grado Meteorización <input type="text"/>	Espacio entre Discontinuidades <input type="text"/>	Azimuth <input type="text"/>	Tipo <input type="text"/>
Grado Compactación <input type="text"/>	Abertura entre Discontinuidades <input type="text"/>	Profundidad <input type="text"/>	Textura <input type="text"/>
Afloramiento Agua <input type="text"/>	Material Relleno <input type="text"/>		

A. Fotos Macizo Rocoso

MR1	MR2	MR3
-----	-----	-----

B. Otros Aspectos Macizo rocoso

4. Depósitos Superficiales

Tipo Depósito Superficial

Composición Depósito Superficiales Porcentaje

A. Fotos Depósitos superficiales

DS1	DS2	DS3
-----	-----	-----

B. Otros Aspectos Depósito superficial

#. Observaciones Generales

Sincroniza con Geomorfología
 Guardar

ANEXO II. CÓDIGOS DE FICHAS DE CAMPO LEVANTADAS EN EL CANTÓN

CGg-NVII_D2-57-0111	CGg-NVII_D4-57-0216	CGg-NVII_F2-59-0372
CGg-NVII_D2-57-0112	CGg-NVII_D4-57-0217	CGg-NVII_F2-59-0373
CGg-NVII_D2-57-0114	CGg-NVII_D4-57-0219	CGg-NVII_F2-59-0374
CGg-NVII_D2-57-0115	CGg-NVII_D4-57-0221	CGg-NVII_F2-59-0375
CGg-NVII_D2-57-0116	CGg-NVII_D4-57-0224	CGg-NVII_F2-59-0376
CGg-NVII_D2-57-0120	CGg-NVII_D4-57-0225	CGg-NVII_F2-59-0377
CGg-NVII_D2-57-0121	CGg-NVII_D4-57-0227	CGg-NVII_F2-59-0378
CGg-NVII_D4-57-0123	CGg-NVII_D4-57-0231	CGg-NVII_F2-59-0380
CGg-NVII_D4-57-0124	CGg-NVII_D4-57-0232	CGg-NVII_F2-59-0381
CGg-NVII_D4-57-0125	CGg-NVII_D4-57-0234	CGg-NVII_F2-59-0382
CGg-NVII_D4-57-0126	CGg-NVII_D4-57-0236	CGg-NVII_F2-59-0383
CGg-NVII_D4-57-0127	CGg-NVII_D4-57-0239	CGg-NVII_F2-59-0384
CGg-NVII_D4-57-0128	CGg-NVII_D4-57-0240	CGg-NVII_F2-59-0386
CGg-NVII_D4-57-0129	CGg-NVII_D4-57-0243	CGg-NVII_F2-59-0387
CGg-NVII_D4-57-0130	CGg-NVII_D4-57-0244	CGg-NVII_F2-59-0388
CGg-NVII_D4-57-0131	CGg-NVII_D4-57-0245	CGg-NVII_F2-59-0389
CGg-NVII_D4-57-0132	CGg-NVII_D4-57-0248	CGg-NVII_F2-59-0390
CGg-NVII_D4-57-0135	CGg-NVII_D4-57-0249	CGg-NVII_F2-59-0391
CGg-NVII_D4-57-0137	CGg-NVII_D4-57-0250	CGg-NVII_F2-59-0392
CGg-NVII_D4-57-0139	CGg-NVII_D4-57-0252	CGg-ÑVII_C3-57-0182
CGg-NVII_D4-57-0140	CGg-NVII_D4-57-0254	CGg-ÑVII_C3-57-0186
CGg-NVII_D4-57-0141	CGg-NVII_D4-57-0255	CGg-ÑVII_C3-57-0188
CGg-NVII_D4-57-0142	CGg-NVII_D4-57-0256	CGg-ÑVII_C3-57-0189
CGg-NVII_D4-57-0145	CGg-NVII_D4-57-0258	CGg-ÑVII_C3-57-0191
CGg-NVII_D4-57-0146	CGg-NVII_D4-57-0259	CGg-ÑVII_C3-57-0192
CGg-NVII_D4-57-0147	CGg-NVII_D4-57-0260	CGg-ÑVII_C3-57-0193
CGg-NVII_D4-57-0149	CGg-NVII_D4-57-0261	CGg-ÑVII_C3-57-0202
CGg-NVII_D4-57-0153	CGg-NVII_D4-57-0264	CGg-ÑVII_C3-57-0204
CGg-NVII_D4-57-0177	CGg-NVII_D4-57-0265	CGg-ÑVII_C3-57-0205
CGg-NVII_D4-57-0180	CGg-NVII_D4-57-0266	CGg-ÑVII_C3-57-0206
CGg-NVII_D4-57-0208	CGg-NVII_F2-59-0367	CGg-ÑVII_C3-57-0210
CGg-NVII_D4-57-0209	CGg-NVII_F2-59-0368	CGg-ÑVII_C3-57-0246
CGg-NVII_D4-57-0212	CGg-NVII_F2-59-0369	CGg-ÑVII_C3-57-0247
CGg-NVII_D4-57-0213	CGg-NVII_F2-59-0370	
CGg-NVII_D4-57-0214	CGg-NVII_F2-59-0371	

ANEXO III. GLOSARIO DE GEOFORMAS

El presente glosario recoge, en orden alfabético, la definición de cada una de las geoformas del Catálogo de Cartografía Geomorfológica a escala 1:25.000, realizada dentro del Proyecto de Cartografía Temática del Ecuador.

La denominación y definición de cada una de las geoformas ha seguido, a grandes rasgos, la nomenclatura y base conceptual definida por el Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE (exClirsén), del que este proyecto es continuación, con algunas modificaciones específicas llevadas a cabo en este trabajo.

Asimismo, se incluyen diversos términos no contemplados en el catálogo de dicho organismo, cuya nomenclatura y definición se ajustan a las establecidas en la bibliografía geomorfológica de uso más extendido y aceptado o, en su defecto, al sentido con que han sido utilizadas en el presente proyecto. Se ha tenido especialmente en cuenta, para la definición y comentarios de algunos términos de nueva incorporación, la publicación "Los paisajes naturales del Ecuador: las regiones y paisajes del Ecuador" (Winckell, A., 1997).

Nota: Las expresiones que aparecen *en cursiva* dentro de una definición hacen referencia a otra geoforma recogida en el glosario.

-A-

ABRUPTO DE COLADA DE LAVA: vertiente frontal de una *colada de lava antigua* o de una *colada de lava muy reciente*, con pendiente sensiblemente superior al resto del cuerpo lávico.

ABRUPTO DE CONO DE DEYECCIÓN: escarpe o escalón que limita con una *superficie de cono de deyección* y que forma parte del mismo cuerpo sedimentario.

ABRUPTO DE CONO DE DEYECCIÓN DISECTADO: escarpe o escalón que limita con una *superficie de cono de deyección disectado* y que forma parte del mismo cuerpo sedimentario.

ABRUPTO DE CONO DE ESPARCIMIENTO: escarpe o escalón que limita con la superficie de cualquier tipo de cono de esparcimiento (*ver superficie de cono de esparcimiento, superficie de cono de esparcimiento disectado, superficie de cono de esparcimiento muy disectado*) y que forma parte del mismo cuerpo sedimentario.

ABRUPTO DE SUPERFICIE ALTA: escarpe o escalón que limita con una *superficie alta* o con una *superficie alta disectada*, presentando una inclinación sensiblemente superior a la de ésta.

ABRUPTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL: escarpe o escalón que limita con una *superficie horizontal* o con una *superficie horizontal disectada*, presentando una inclinación sensiblemente superior a la de ésta.

ABRUPTO DE SUPERFICIE INCLINADA: escarpe o escalón que limita con una *superficie inclinada* o con una *superficie inclinada disectada*, presentando una inclinación sensiblemente superior a la de ésta.

ACANTILADO: ladera junto a la línea de costa, de pendiente muy elevada y desnivel usualmente mayor a 15 metros.

ACANTILADO ROCOSOS EN DESPLOME: ladera de pendiente muy pronunciada, que incluye partes de la misma en voladizo o salientes respecto a la vertical.

ACUMULACIONES PIROCLÁSTICAS CON BANCOS Y/O LÓBULOS DE GELIFLUXIÓN: geoforma constituida por depósitos piroclásticos, sometidos a un flujo lento de la capa superior del suelo, empapada en agua en la época de deshielo. Se produce en ambientes periglaciares.

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: rocas aflorantes en superficie, con escasa o nula presencia de suelo, que no presentan rasgos morfológicos específicos. Para medios morfoclimáticos fríos, de características periglaciares, se utiliza el término *afloramientos rocosos en ambiente periglaciario*.

AFLORAMIENTOS ROCOSOS EN AMBIENTE PERIGLACIARIO: rocas en superficie, con escasa o nula presencia de suelo, que no presentan rasgos morfológicos específicos. Se utiliza esta denominación cuando aparecen en zonas de ambiente

periglaciario que, no obstante, han podido estar sometidas anteriormente a modelado glaciar.

APLANAMIENTO KÁRSTICO: superficie aplanada, producto de la disolución de rocas carbonatadas. A veces sobresalen de su interior, o la rodean, relieves residuales kársticos.

ÁREAS ENDORREICAS EN LLANURAS ALUVIALES Y TERRAZAS: depresiones en llanuras aluviales (*valle fluvial, llanura de inundación*) o en terrazas fluviales (*terrazza media, terraza alta, terraza colgada, terrazas escalonadas, terrazas indiferenciadas*) en las que el agua se acumula de forma estacional o permanente. Incluyen toda el área de la cubeta o depresión, es decir, toda la superficie deprimida a partir de la cual el agua discurre hacia el interior de la Geoforma delimitada.

-B-

BADLANDS: áreas que presentan un modelado con intensa disección en surcos erosivos, cárcavas y barrancos, con frecuente agrietamiento en superficie. Están desprovistas de suelo productivo y, preferentemente, se desarrollan en materiales arcillosos y margosos bajo climas áridos y semiáridos.

BARJANES: dunas con forma de media luna en planta, cuyos cuernos apuntan en el sentido de la procedencia del viento dominante.

BARRA O CRESTA ESTRUCTURAL: relieve estructural proporcionado por capas muy inclinadas, próximas a la vertical, con las que la superficie del terreno es coincidente.

BARRANCO: en este proyecto, se considera bajo esta denominación a un curso de orden menor, situado habitualmente en cabeceras fluviales, con fuertes pendientes transversales al eje de drenaje; representa una forma de incisión fluvial, que no contiene sedimentos cubriendo de forma generalizada su lecho y márgenes.

BASÍN: depresión endorreica, con acumulación de agua permanente o estacional, situada en la Llanura Aluvial reciente de la región Costa.

BLOQUES ERRÁTICOS GLACIARES: bloques, de dimensiones métricas a decamétricas, depositados por la actividad glaciar, generalmente de litologías distintas a las del material sobre el que se asientan.

-C-

CALDERA: depresión circular o elíptica, situada en la parte superior del edificio volcánico, similar a un *cráter*, pero de dimensiones mucho mayores. Muchas calderas se han generado por hundimiento y colapso de la cámara magmática, tras la emisión de grandes cantidades de material volcánico.

CAMPO DE DUNAS: área de extensión considerable, ocupada por dunas o colinas de arena de diferentes geometrías.

CAMPO DE REG: desierto pedregoso.

CASQUETE DE CUMBRE NIVAL, CASQUETE GLACIAR: masa de hielo y nieve, a veces con presencia de glaciares actuales, situada en la cumbre de un cono volcánico.

CAUCES ABANDONADOS, MEANDROS ABANDONADOS: segmentos fluviales abandonados por el cambio de trazado del río en su evolución. Presentan relleno de sedimentos y los suelos que se desarrollan en ellos son susceptibles de aprovechamiento agrícola.

CAUCES Y MEANDROS OCASIONALMENTE FUNCIONALES: tramos o segmentos fluviales que, aun habiendo sido abandonados por el cauce, son ocupados por las aguas en períodos de avenida o de grandes precipitaciones. Aparecen en ellos, con frecuencia, suelos de carácter pantanoso.

CERRO TESTIGO: cerro aislado, que sobresale respecto al entorno adyacente, que permanece como residuo o testigo de la erosión de los materiales que le rodeaban.

CHIMENEAS DE HADAS: formas de erosión caracterizadas por la presencia de torrecillas o pináculos, abruptos y próximos entre sí, culminadas por grandes cantos o bloques. Se generan en materiales poco coherentes y muy heterométricos.

CIRCO GLACIAR: depresión semicircular o semielíptica, dominada por laderas de elevada pendiente y que está, o ha estado, ocupada por el hielo. La depresión conlleva la existencia de un umbral a la salida del circo, que puede ser de carácter rocoso o estar formado por depósitos glaciares.

COLADA DE LAVA ANTIGUA: cuerpo originado cuando el magma líquido alcanza la superficie y fluye sobre el relieve, dando lugar a una gran diversidad de formas en superficie. Se consideran antiguas a las que ya aparecen con cobertura edáfica.

COLADA DE LAVA MUY RECIENTE: cuerpo originado cuando el magma líquido alcanza la superficie y fluye sobre el relieve, dando lugar a una gran diversidad de formas en superficie. Se consideran como muy recientes a las coladas en que aparece la roca en superficie, sin cobertura edáfica ni aprovechamiento agrícola.

COLINAS DE CIMAS REDONDEADAS DE ASPECTO TABULAR: similares a las *colinas en media naranja*, estas geofomas presentan más alargada y aplanada su zona superior, debido a que el frente de alteración adopta un patrón geométrico subparalelo a la superficie. Son exclusivas de la región Amazonía.

COLINAS EN MEDIA NARANJA: colinas redondeadas, de contornos elípticos, que se presentan agrupadas con extensiones variables. Son exclusivas de la región Amazonía y obedecen, fundamentalmente, a procesos de intensa meteorización

química, por la progresión en profundidad del frente de alteración en geometrías onduladas.

COLUVIO-ALUVIAL RECIENTE: depósito superficial, cuyos materiales proceden tanto de las laderas que atraviesan como del transporte ligado a una dinámica fluvial restringida. Habitualmente, rellenan vaguadas y los márgenes de pequeños drenajes, aunque también pueden situarse, con límites difusos, en zonas de transición de laderas y sus depósitos de piedemonte a otras geoformas ligadas a drenajes mayores. Por contraposición con la geoforma *coluvio-aluvial antiguo*, en éstos el grado de disección es bajo y no cuentan con una vegetación pionera bien desarrollada.

COLUVIO-ALUVIAL ANTIGUO: depósito superficial, cuyos materiales proceden tanto de las laderas que atraviesan como del transporte ligado a una dinámica fluvial restringida. Habitualmente, rellenan vaguadas y los márgenes de pequeños drenajes, aunque también pueden situarse, con límites difusos, en zonas de transición de laderas y sus depósitos de piedemonte con otras geoformas ligadas a drenajes mayores. Se consideran como "antiguos" a los que presentan un cierto grado de disección (medio a alto) y sobre ellos aparece una vegetación pionera bien desarrollada.

COLUVIÓN ANTIGUO: un coluvión es un depósito superficial constituido por materiales heterogéneos de suelo y fragmentos de roca, en diferente proporción, depositados habitualmente al pie de las laderas por arrastre mediante arroyada difusa u otros fenómenos gravitacionales asociados a la evolución de las laderas. Se considera como "antiguos" a los que presentan un cierto grado de disección (medio a alto) y sobre ellos aparece una vegetación pionera bien desarrollada.

COLUVIÓN RECIENTE: un coluvión es una formación superficial constituida por materiales heterogéneos de suelo y fragmentos de roca, en diferente proporción, depositados habitualmente al pie de las laderas por arrastre mediante arroyada difusa u otros fenómenos gravitacionales asociados a la evolución de las laderas. Por contraposición con la Geoforma *coluvión antiguo*, en éstos el grado de disección es bajo y no cuentan con una vegetación pionera bien desarrollada.

CONO ADVENTICIO: cono secundario, situado en la ladera de otro cono mayor o en la *caldera* de un volcán.

CONO DE DERRUBIOS: fragmentos rocosos, habitualmente al pie de laderas de pendiente pronunciada, con forma en planta en segmento de cono o abanico, transportados por un canal.

CONO MUY BIEN CONSERVADO CON ACTIVIDAD VOLCÁNICA ACTUAL E INTENSO RETOQUE GLACIAR: cono volcánico, con actividad en los últimos 500 años (de acuerdo al Instituto Geofísico del Ecuador), que ha sido recubierto por hielo y nieve durante los períodos glaciares cuaternarios. Sus flancos aparecen excavados por valles glaciares, con frecuentes *morrenas* asociadas. Pertenece al tipo denominado estratovolcán (grandes edificios volcánicos formados por alternancias de lavas y piroclastos).

CONO MUY BIEN CONSERVADO CON ACTIVIDAD VOLCÁNICA ACTUAL Y MODERADO RETOQUE GLACIAR: cono volcánico, con actividad en los últimos 500 años (de acuerdo al Instituto Geofísico del Ecuador), que no fue recubierto totalmente por hielo y nieve durante los períodos glaciares cuaternarios y en el que, por tanto, el modelado glaciar se limita a la parte superior de la construcción. Pertenece al tipo denominado estratovolcán (grandes edificios volcánicos formados por alternancias de lavas y piroclastos).

CONO MUY BIEN CONSERVADO CON ACTIVIDAD VOLCÁNICA ACTUAL Y SIN RETOQUE GLACIAR: cono volcánico, con actividad en los últimos 500 años (de acuerdo al Instituto Geofísico del Ecuador), que no fue recubierto por hielo y nieve durante los períodos glaciares cuaternarios y en el que, por tanto, no existen formas ni depósitos glaciares. Pertenece al tipo denominado estratovolcán (grandes edificios volcánicos formados por alternancias de lavas y piroclastos).

CONO SIN ACTIVIDAD VOLCÁNICA ACTUAL E INTENSO RETOQUE GLACIAR: cono volcánico, sin actividad en los últimos 500 años (de acuerdo al Instituto Geofísico del Ecuador), que ha sido recubierto por hielo y nieve durante los períodos glaciares cuaternarios. Sus flancos aparecen excavados por valles glaciares, con frecuentes *morrenas* asociadas. Pertenece al tipo denominado estratovolcán (grandes edificios volcánicos formados por alternancias de lavas y piroclastos).

CONO SIN ACTIVIDAD VOLCÁNICA ACTUAL Y MODERADO RETOQUE GLACIAR: cono volcánico, sin actividad en los últimos 500 años (de acuerdo al Instituto Geofísico del Ecuador), que no fue recubierto totalmente por hielo y nieve durante los períodos glaciares cuaternarios y en el que, por tanto, la remodelación glaciar se limita a la parte superior de la construcción. Pertenece al tipo denominado estratovolcán (grandes edificios volcánicos formados por alternancias de lavas y piroclastos).

CONO SIN ACTIVIDAD VOLCÁNICA Y SIN HUELLAS GLACIARES: cono volcánico, sin actividad en los últimos 500 años (de acuerdo al Instituto Geofísico del Ecuador), que no fue recubierto por hielo y nieve durante los períodos glaciares cuaternarios y en el que, por tanto, no existen formas ni depósitos glaciares. Pertenece al tipo denominado estratovolcán (grandes edificios volcánicos formados por alternancias de lavas y piroclastos).

CONOS DESMENUZADOS: conos volcánicos, en los que aún se puede reconocer su estructura, constituidos mayoritariamente por piroclastos. Se originan por moderadas explosiones volcánicas con cantidades intermedias de gas y suelen tener un tamaño reducido.

CORDÓN ARENOSO FLUVIAL: bandas arenosas que suelen disponerse en el límite de las depresiones interfluviales pantanosas de la región Amazonía. Aparecen con un desarrollo de varios kilómetros, ancho de varios metros y están sobreelevados de 1 a 3 metros sobre el nivel del pantano.

CORDÓN LITORAL: barra de sedimentos, paralela u oblicua a la línea de costa, situada en las zonas intermareal y submareal.

CORNISA DE MESA O MESETA: abrupto de una *superficie de mesa* o de una *superficie de mesa disectada*, que limita con ella y que se sitúa inmediatamente por encima de la *vertiente de mesa*. Su límite inferior coincide con el estrato duro o resistente sobre el que se desarrolla la superficie de mesa.

CORNISA DE MESETA VOLCÁNICA: abrupto de una *superficie de meseta volcánica* o de una *superficie de meseta volcánica disectada*, que limita con ella y que se sitúa inmediatamente por encima de la *vertiente de meseta volcánica*.

CRÁTER: apertura, en forma de depresión circular o elíptica en planta, situada en la parte superior de un cono volcánico.

CUBETA GLACIAR: parte más baja del circo glaciar, profundizada o sobreexcavada por la acción del hielo.

CUBETA O CUENCA DE DEFLACIÓN: depresión cerrada, de dimensiones variables y planta redondeada, elíptica o arriñonada, que aparece en ambientes desérticos o semiáridos.

-D-

DEPÓSITO GLACIAR MODELADO POR ACCIÓN FLUVIAL: sedimentos de origen glaciar que no guarda su morfología inicial debido a la acción de las aguas de escorrentía, difusas o canalizadas.

DEPÓSITOS DE DESLIZAMIENTO, MASA DESLIZADA: material originado como consecuencia de un movimiento en masa a través de una superficie de rotura, plana o curva. Es un tipo particular de *coluvión reciente* o de *coluvión antiguo*, en el que aún se pueden apreciar indicios o evidencias de su génesis mediante dicho mecanismo.

DEPRESIÓN DE DECANTACIÓN: depresión endorreica, con acumulación de agua permanente o estacional, en la llanura aluvial antigua de la región Costa.

DEPRESIÓN LAGUNAR: depresión en la que el agua se acumula, de forma temporal o permanente, no ligada a valles fluviales ni terrazas (en estos emplazamientos se les denomina *áreas endorreicas en llanuras aluviales y terrazas*). Quedan asimismo excluidas de este término geofomas similares ligadas al medio glaciar o volcánico con denominaciones específicas (*laguna glaciar, cubeta glaciar, laguna en fondo de cráter o caldera*).

DIQUE O BANCO ALUVIAL: bandas de sedimentos que bordean el canal fluvial y buzan suavemente hacia la llanura de inundación. Se conocen también como diques naturales o motas ("levees", en inglés).

DOLINA, CAMPO DE DOLINAS: depresión cerrada, circular o elíptica, que se forma en la superficie de rocas karstificables (rocas calcáreas y evaporíticas). Sus dimensiones son variables, de orden métrico a hectométrico. Se pueden presentar aisladas o agrupadas.

DOMO VOLCÁNICO: elevación volcánica en forma de domo o cúpula, constituida por lavas viscosas empobrecidas en gases, acumuladas sobre la propia boca eruptiva y con muy escasa dispersión lateral.

DRUMLINS: sedimentos glaciares con forma de colinas alargadas, con su eje mayor paralelo a la dirección del movimiento del hielo.

-E-

ENCAÑONAMIENTO: forma de encajamiento fluvial, limitada por laderas de pendientes muy pronunciadas y desniveles superiores a 50 metros.

ESCARPE DE CUESTA MARINA: abrupto de una *superficie de cuesta marina* que limita con ella y que se sitúa inmediatamente por encima de la *vertiente de cuesta marina*. Su límite inferior coincide con el estrato duro o resistente sobre el que se desarrolla la *superficie de cuesta marina*.

ESCARPE DE DESLIZAMIENTO: cicatriz erosiva que representa la superficie de rotura de una masa deslizada, situada en la cabecera del deslizamiento.

ESCARPE DE FALLA: escarpe generado en el límite del bloque levantado con el bloque hundido de una falla, de considerable desarrollo lineal y expresión morfológica bien marcada. Es usual que dicha expresión morfológica se refleje mediante facetas triangulares o trapezoidales, que se desarrollen abanicos aluviales a su pie o que aparezcan otras formas características en función del contexto morfoestructural en que se localiza el escarpe.

ESCARPE DE MESA MARINA: abrupto de una *superficie de mesa marina* o de una *superficie de mesa marina disectada* que limita con ella y que se sitúa inmediatamente por encima de la *vertiente de mesa marina*. Su límite inferior coincide con el estrato duro o resistente sobre el que se desarrolla la *superficie de mesa marina* o la *superficie de mesa marina disectada*.

ESKER: cordón de arena y grava, originado por canales fluviales de deshielo.

ESPINAZO: resalte morfológico rocoso, de desarrollo predominantemente lineal.

-F-

FLANCOS SUPERIORES RECTILÍNEOS CUBIERTOS CON PROYECCIONES PIROCLÁSTICAS: recubrimiento de piroclastos en las zonas superiores de un edificio volcánico (de tipo estratovolcán), conformando segmentos de ladera sensiblemente rectilíneos.

FLUJO DE LODO: depósitos de lodos, o de lodos con fragmentos gruesos, originados por el desplazamiento de una masa de materiales que se han comportado como un fluido. Suelen presentar, en consecuencia, formas lobuladas en su parte frontal y ondulaciones en las partes anteriores.

FLUJO DE PIROCLASTOS: corriente de piroclastos de alta densidad, semifluida, que se desplaza a ras del suelo, en que las partículas están envueltas por gas a alta temperatura; cuando son ricas en fragmentos pumíticos y escoria, el depósito resultante se llama ignimbrita. En función de la temperatura de emplazamiento se pueden presentar sin consolidar, cementadas o soldadas, lo que proporciona expresiones morfológicas diferentes. Su distribución está controlada por la topografía del edificio volcánico del que proceden y la del entorno circundante, cubriendo parte de las laderas del cono y con tendencia a acumularse en valles y depresiones.

FONDO DE VALLE GLACIAR: forma producida por una masa de hielo canalizada, generalmente con perfil transversal en U y limitada por paredes de pendientes pronunciadas (*vertiente de valle glaciario*). A menudo la forma típica transversal en U queda enmascarada por una nivelación producida por un posterior remodelado fluvial.

FRENTE DE CHEVRON: abrupto de una *superficie de chevron*, que limita con ella y que se sitúa inmediatamente por encima de la *vertiente de chevron*. Su límite inferior coincide con el estrato duro o resistente sobre el que se desarrolla la *superficie de chevron*.

FRENTE DE CUESTA: abrupto de una *superficie de cuesta* o de una *superficie de cuesta disectada*, que limita con ella y que se sitúa inmediatamente por encima de la *vertiente de cuesta*. Su límite inferior coincide con el estrato duro o resistente sobre el que se desarrolla la superficie de cuesta.

-G-

GARGANTA: forma de encajamiento fluvial. Las laderas que limitan estas incisiones presentan pendientes muy pronunciadas y desniveles superiores a 15 metros.

GLACIS DE EROSIÓN: rampa similar a un *glacis de esparcimiento*, pero labrada sobre roca dura y, consecuentemente, sin depósito.

GLACIS DE ESPARCIMIENTO: rampa o superficie ligeramente cóncava y de baja inclinación que, en situación de piedemonte, enlaza un relieve con una llanura a partir de una rotura de pendiente en la ladera de la que arranca. Está formado por una delgada cobertera de depósitos detríticos.

GLACIS DE ESPARCIMIENTO DISECTADO: *glacis de esparcimiento* en que la escorrentía superficial se muestra concentrada y se aprecia un cierto grado de incisión en dichas formas de drenaje.

GLACIS-CONO DE ESPARCIMIENTO: *glacis de esparcimiento* que, en planta, presenta forma en segmento de cono o abanico.

-H-

HONDONADAS PANTANOSAS DE ORIGEN GLACIAR-PERIGLACIAR: zonas de drenaje deficiente, de características endorreicas o semiendorreicas, con suelos esponjosos, montículos almohadillados y otras microformas producto de la acción de los ciclos de hielo-deshielo. A veces se presentan capturadas por la red fluvial, tendiendo a perder su morfología original.

HORN: pico piramidal originado por la coalescencia de varios *circos glaciares*.

-I-

INSELBERG: colina aislada de laderas abruptas, que surge bruscamente en una zona de moderada o nula inclinación. Aunque aparecen con mayor frecuencia en las regiones tropicales, se presentan también en otros ambientes morfoclimáticos.

INTERFLUVIO DE CIMAS ESTRECHAS: geoforma de desarrollo lineal y estrecho, a ambos lados de una divisoria de aguas, que ocupa posiciones cimeras. Está caracterizado por la presencia de crestas o aristas agudas en su interior.

INTERFLUVIO DE CIMAS REDONDEADAS: geoforma de desarrollo lineal y estrecho, a ambos lados de una divisoria de aguas de perfil transversal suave y redondeado, que ocupa posiciones cimeras.

-K-

KAME: pequeñas colinas cónicas de grava y arena, originadas por sedimentación en cubetas de hielo y cavidades glaciares.

-L-

LAGUNA COLMATADA: depósito de antigua laguna.

LAGUNA EN FONDO DE CRÁTER O CALDERA: cuerpo de agua, permanente o semipermanente, que ocupa el fondo de un *cráter* volcánico o de una *caldera* volcánica.

LAGUNA GLACIAR: término genérico para designar cualquier tipo de laguna originada en ambiente glaciario o subglaciario. Se presentan con frecuencia asociadas a ciertas geoformas glaciares (*circo glaciario*, *cubeta glaciario*, *fondo de valle glaciario*, entre las más usuales).

LAHAR: colada de detritos o de barro, originada por agua, cenizas volcánicas y otros piroclastos. Estos depósitos se canalizan a través de la red de barrancos y cauces preexistentes.

LAPIAZ, CAMPO DE LAPIAZ: forma superficial labrada por erosión y disolución en rocas karstificables (calizas, dolomías, calcarenitas y rocas evaporíticas, principalmente), que da lugar a pequeños surcos o agujeros, con dimensiones que varían entre el orden centimétrico y métrico. Pueden llegar a ocupar considerables extensiones en macizos carbonáticos.

LLANURA DE DEPÓSITOS FLUVIO-LACUSTRES: superficie de escasa pendiente, con presencia de sedimentos resultantes de la superposición o yuxtaposición de las dinámicas fluvial y lacustre.

LLANURA DE DEPÓSITOS VOLCÁNICOS: planicie ubicada al pie de un edificio volcánico, con depósito de diferentes materiales piroclásticos arrastrados. A menudo llegan a comunicarse, mediante límites difusos, con el medio aluvial.

-M-

MACIZO ROCOSO: conjunto esencialmente rocoso de cierta extensión, que destaca sobre el entorno inmediato, desprovisto en la mayoría de su superficie de suelos, vegetación y depósitos superficiales.

MACROCOLUVIÓN: *coluvión reciente* o *coluvión antiguo* de grandes dimensiones. De forma convencional, se consideran como tales a aquellos que cuentan con una superficie superior a 140 hectáreas.

MANTO EÓLICO: acumulaciones de arenas de origen eólico en terrenos aplanados, con espesores que fluctúan entre unos centímetros y varios metros.

MARISMA, ESTUARIO: las marismas son llanuras intermareales en costas con oleaje de baja y moderada energía, surcadas por una red de canales, que pueden estar asociadas a estuarios (desembocaduras de valles sumergidas bajo el mar).

MESAS TRIANGULARES VOLCÁNICAS (PLANÈZES): facetas triangulares, en forma de rellanos horizontales o con ligera inclinación, que se producen en las laderas de los conos volcánicos, como consecuencia de la progresiva incisión de barrancos divergentes desde su zona de cumbre.

MORFOLOGÍA ABOLLADA: ladera o parte de la misma cuyo perfil longitudinal se encuentra repleto de pequeñas a medianas prominencias y que, en conjunto, irregularizan la superficie de la vertiente. Se deben a antiguos movimientos en masa superpuestos, a menudo superficiales, que afectan al regolito (alterita o saprolito) o al propio sustrato geológico si está formado por materiales de cierta plasticidad (arcillas o margas, principalmente).

MORRENA DE FONDO: *morrena* que cubre una llanura, un *fondo de valle glaciar* o un *valle glaciar colgado*.

MORRENA FRONTAL, ARCO MORRÉNICO: *morrena* originada en el frente de un glaciar; a veces llega a unirse con una *morrena lateral*, adquiriendo en planta una forma arqueada.

MORRENA LATERAL: *morrena* originada en el margen lateral del glaciar, a menudo adosada a la *vertiente de valle glaciar*.

MORRENAS: sedimento glaciar formado por materiales pobremente clasificados y heterométricos, que a menudo incluye grandes bloques en una matriz de grano fino. Se aplica este término cuando no se puede diferenciar claramente el tipo de *morrena* de que se trata (*morrena de fondo, morrena lateral o morrena frontal, arco morrénico*).

-N-

NEBKHAS: dunas obstaculizadas por la vegetación, que a menudo ocupan considerables extensiones.

NICHO DE NIVACIÓN: *circo glaciar* embrionario, de reducido tamaño, que puede aparecer en ambiente periglacial.

NIVEL LIGERAMENTE ONDULADO: planicie ondulada, característica de la llanura aluvial reciente e inundable de la región Costa.

NIVEL ONDULADO CON PRESENCIA DE AGUA: planicie ondulada, característica de la llanura aluvial reciente e inundable de la región Costa, con presencia temporal o permanente de agua en parte de su superficie.

NIVEL PLANO: planicie característica de la llanura aluvial reciente e inundable de la región Costa.

NIVELES ESTRUCTURALES SOBRE LAVAS ENDURECIDAS: superficies proporcionadas por materiales volcánicos resistentes a la erosión, normalmente de carácter lávico, aunque también las pueden proporcionar otros materiales volcánicos cementados o fuertemente consolidados.

-P-

PAN DE AZÚCAR: tipo particular de *inselberg*, con forma de domo más o menos puntiagudo, desarrollado en rocas masivas resistentes. Suelen presentarse en áreas de relativa estabilidad cortical y, aunque no son exclusivas de ningún ambiente morfoclimático, son más abundantes en áreas tropicales húmedas.

PANTANO, DEPRESIÓN PANTANOSA: área con drenaje deficiente, en la que el agua tiende a acumularse, en depresiones interfluviales. El término se reserva preferentemente para la región Amazonía.

PITONES O AGUJAS VOLCÁNICAS: masas de lava que rellenaron la chimenea de un volcán y permanecen como restos o testigos del mismo.

PLANICIE ARENOSA DE ORIGEN LAHÁRICO: planicie compuesta por material volcánico de textura predominantemente arenosa, que está o ha estado alimentada por un *lahar* o varios.

PLANICIE COSTERA: superficie plana o ligeramente inclinada hacia la costa, limitada por un pequeño escarpe. Está constituida por sedimentos marinos y eólicos.

PLANICIE INTERMONTANA: superficie a grandes rasgos horizontal, rodeada en su mayoría por relieves de carácter montañoso.

PLAYA MARINA: acumulación de arena, grava o una mezcla de ambas, situada en el límite del mar y el continente, en cuya dinámica interviene fundamentalmente el oleaje.

POLJE: depresión cerrada de grandes dimensiones (de orden kilométrico), con fondo plano y sensiblemente horizontal, característica de regiones kársticas.

-R-

RAMPAS DE PIEDEMONTE DE CONO VOLCÁNICO: superficies ligeramente cóncavas, que arrancan de la parte inferior de un *cono* volcánico y enlazan con una llanura.

RELIEVE COLINADO ALTO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos y con desniveles en su interior comprendidos entre 100 y 200 metros.

RELIEVE COLINADO BAJO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos y con desniveles en su interior comprendidos entre 15 y 25 metros.

RELIEVE COLINADO MEDIO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos y con desniveles en su interior comprendidos entre 25 y 100 metros.

RELIEVE COLINADO MUY ALTO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos y con desniveles en su interior comprendidos entre 200 y 300 metros.

RELIEVE COLINADO MUY BAJO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos y con desniveles en su interior comprendidos entre 5 y 15 metros.

RELIEVE EN RELLANOS Y APLANAMIENTOS INCLINADOS: relieve formado por una sucesión de superficies inclinadas, alternantes con segmentos de ladera con diferente inclinación o forma, de origen incierto o de difícil adscripción genética.

RELIEVE EN RELLANOS Y ONDULACIONES ESCALONADAS: relieve en gradas que da lugar a plataformas horizontales o subhorizontales, alternantes con segmentos de ladera de mayor inclinación, de origen incierto o de difícil adscripción genética.

RELIEVE LACUSTRE ONDULADO: área que delimita un conjunto de pequeñas depresiones lagunares o lagunas no mapeables, situada en llanuras aluviales (*valle fluvial, llanura de inundación*) o en terrazas fluviales (*terrazza media, terraza alta, terraza colgada, terrazas escalonadas, terrazas indiferenciadas*).

RELIEVE MONTAÑOSO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos y con desniveles en su interior de más de 300 metros.

RELIEVE ONDULADO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos. El desnivel interno de este relieve es inferior a 5 metros, por lo que da lugar a formas muy suaves.

RELIEVE VOLCÁNICO COLINADO ALTO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos, desarrollada sobre sustratos volcánicos no ligados a emisiones volcánicas recientes (generalmente, sustratos volcánicos pre-holocenos). Presenta, en su conjunto, un cierto grado de disección, con desniveles máximos en su interior comprendidos entre 100 y 200 metros.

RELIEVE VOLCÁNICO COLINADO BAJO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos, desarrollada sobre sustratos volcánicos no ligados a emisiones volcánicas recientes (generalmente, sustratos volcánicos pre-holocenos). Presenta, en su conjunto, un ligero grado de disección, con desniveles máximos en su interior comprendidos entre 15 y 25 metros.

RELIEVE VOLCÁNICO COLINADO MEDIO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos, desarrollada sobre sustratos volcánicos no ligados a emisiones volcánicas recientes (generalmente, sustratos volcánicos pre-holocenos). Presenta, en su conjunto, un cierto grado de disección, con desniveles máximos en su interior comprendidos entre 25 y 100 metros.

RELIEVE VOLCÁNICO COLINADO MUY ALTO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos, desarrollada sobre sustratos volcánicos no ligados a emisiones volcánicas recientes (generalmente, sustratos volcánicos pre-holocenos). La disección, en conjunto, le permite alcanzar desniveles máximos en su interior de entre 200 y 300 metros.

RELIEVE VOLCÁNICO COLINADO MUY BAJO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos, desarrollada sobre sustratos volcánicos no ligados a emisiones volcánicas recientes (generalmente, sustratos volcánicos pre-

holocenos). Presenta, en su conjunto, un ligero grado de disección, con desniveles máximos en su interior comprendidos entre 5 y 15 metros.

RELIEVE VOLCÁNICO MONTAÑOSO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos, desarrollada sobre sustratos volcánicos no ligados a emisiones volcánicas recientes (generalmente, sustratos volcánicos pre-holocenos). La disección, en conjunto, le permite alcanzar desniveles máximos en su interior de más de 300 metros.

RELIEVE VOLCÁNICO ONDULADO: forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos, desarrollada sobre sustratos volcánicos no ligados a emisiones volcánicas recientes (generalmente, sustratos volcánicos pre-holocenos). El desnivel interno de este relieve es inferior a 5 metros, por lo que da lugar a formas muy suaves.

RELIEVES ESCALONADOS EN CAPAS INCLINADAS: relieves en gradas, resultantes de la erosión diferencial en rocas estratificadas con disposición monoclin.

RELIEVES ESCALONADOS, EN GRADERÍO: relieves en gradas, resultantes de la erosión diferencial en rocas estratificadas en disposición horizontal.

RELIEVES ESCALONADOS SOBRE CAPAS DE LAVA ENDURECIDA Y OTROS MATERIALES VOLCÁNICOS: relieves en gradas, resultantes de la erosión diferencial sobre materiales volcánicos en disposición horizontal o monoclin.

RESTOS DE SUPERFICIE ESTRUCTURAL: partes aisladas o separadas de una superficie estructural (*superficie de mesa, superficie de cuesta, superficie de chevron*, etc.) o en los que difícilmente se reconoce el condicionante estructural en su morfología.

ROCAS ABORREGADAS: conjunto de montículos rocosos, con tamaños que suelen oscilar entre el orden métrico y decamétrico. Presentan un perfil longitudinal asimétrico, con una vertiente de pendiente suave frecuentemente pulida y estriada, y otra irregular y a menudo escarpada. Estas formas están originadas por el movimiento del hielo sobre ellas y son características del modelado de erosión glaciar.

ROCAS DESMENUZADAS POR EL HIELO, CAMPOS Y RÍOS DE BLOQUES: forma debida a la acción de rotura del hielo sobre macizos rocosos, por efecto de la crioclastia. Da lugar a acumulaciones de fragmentos rocosos angulares, en distintas posiciones y localizaciones fisiográficas, algunas de ellas ocupando el fondo de valles y vaguadas.

ROCAS EN CRESTAS Y CUCHILLAS: afloramientos rocosos en ambiente glaciar-periglacial, sin cobertura edáfica o muy escasa, con perfil muy quebrado y salientes puntiagudos. Se utiliza preferentemente esta geofoma para designar afloramientos rocosos de las características descritas, que no presentan ningún rasgo morfológico específico desde el punto de vista funcional, dinámico o genético.

-S-

SALIENTE DE VERTIENTE DE MESA: plataforma horizontal que sobresale del perfil de una *vertiente de mesa o meseta* y que suele corresponder con una intercalación en la serie sedimentaria de un paquete o nivel más resistente que los situados inmediatamente por encima y por debajo.

SALITRAL MARINO: áreas costeras naturales, poco profundas, de acumulación de agua salada. En ellas, la evaporación genera depósitos salinos que recubren su superficie.

SIMA: forma de conducción de las aguas subterráneas de desarrollo eminentemente vertical, abierta al exterior. Frecuente en regiones kársticas.

SUPERFICIE ALTA: superficie elevada con respecto a su entorno inmediato, de origen incierto o de difícil adscripción genética.

SUPERFICIE ALTA DISECTADA: *superficie alta*, en que la escorrentía superficial se muestra concentrada y se aprecia un grado de incisión de moderado a fuerte en dichas formas de drenaje.

SUPERFICIE DE CHEVRON: superficie de origen estructural, con una inclinación significativamente mayor que la *superficie de cuesta*, cuya geometría es coincidente con la de los estratos sobre los que se desarrolla.

SUPERFICIE DE CONO DE DEYECCIÓN: superficie correspondiente a un depósito fluvial con forma en planta que se aproxima a un segmento de cono; se extiende radialmente ladera abajo desde el punto en que el curso de agua abandona el área montañosa de la que procede el depósito. El término cono de deyección es equivalente al de abanico aluvial, al igual que el de cono de esparcimiento. En este proyecto, se reserva el término de cono de deyección para los aparatos de superficie reducida.

SUPERFICIE DE CONO DE DEYECCIÓN DISECTADO: *superficie de cono de deyección*, en que la escorrentía superficial se muestra concentrada y se aprecia un grado de incisión, de moderado a fuerte, en dichas formas de drenaje.

SUPERFICIE DE CONO DE ESPARCIMIENTO: superficie correspondiente a un depósito fluvial con forma en planta que se aproxima a un segmento de cono; se extiende radialmente ladera abajo desde el punto en que el curso de agua abandona el área montañosa de la que procede el depósito. El término cono de esparcimiento es equivalente al de abanico aluvial, al igual que el de cono de deyección. En este proyecto, se reserva el término de cono de esparcimiento para los aparatos de gran tamaño, como los que se desarrollan en los piedemontes de las Cordilleras Occidental y Real.

SUPERFICIE DE CONO DE ESPARCIMIENTO DISECTADO: *superficie de cono de esparcimiento*, en que la escorrentía superficial se muestra concentrada y se aprecia un cierto grado de incisión en dichas formas de drenaje.

SUPERFICIE DE CONO DE ESPARCIMIENTO MUY DISECTADO: *superficie de cono de esparcimiento*, en que se aprecia una alta densidad de formas de drenaje, con elevado grado de incisión.

SUPERFICIE DE CUESTA: superficie de origen estructural ligeramente inclinada, acorde con el buzamiento de los estratos sobre los que se desarrolla.

SUPERFICIE DE CUESTA DISECTADA: *superficie de cuesta* en que la escorrentía superficial se muestra concentrada y se aprecia un grado de incisión de moderado a fuerte en dichas formas de drenaje.

SUPERFICIE DE CUESTA MARINA: superficie ligeramente inclinada, acorde con el buzamiento de los estratos miopliocenos marinos sobre los que se desarrolla. Es una geoforma exclusiva de la región Costa.

SUPERFICIE DE EROSIÓN: aplanamiento, de carácter regional y heredado, resultante de los procesos de erosión y meteorización bajo condiciones climáticas y tectónicas relativamente estables. Estos aplanamientos cortan oblicuamente las estructuras geológicas del sustrato.

SUPERFICIE DE MESA MARINA: superficie de plana a ligeramente ondulada, elevada respecto al territorio circundante, desarrollada sobre materiales miopliocenos marinos horizontales, con cuya geometría es coincidente. Es una geoforma exclusiva de la región Costa.

SUPERFICIE DE MESA MARINA DISECTADA: *superficie de mesa marina* en que la escorrentía superficial se muestra concentrada y se aprecia un grado de incisión de moderado a fuerte en dichas formas de drenaje.

SUPERFICIE DE MESA O MESETA: superficie plana o ligeramente ondulada, elevada respecto al territorio circundante, desarrollada sobre rocas con estratificación horizontal, con cuya geometría es coincidente.

SUPERFICIE DE MESA O MESETA DISECTADA: *superficie de mesa o meseta* en que la escorrentía superficial se muestra concentrada y se aprecia un grado de incisión de moderado a fuerte en dichas formas de drenaje.

SUPERFICIE DE MESETA VOLCÁNICA: superficie plana u ondulada constituida por materiales volcánicos (con frecuencia de carácter lávico) y elevada respecto al entorno circundante.

SUPERFICIE DE MESETA VOLCÁNICA DISECTADA: *superficie de meseta volcánica* en que la escorrentía superficial se muestra concentrada y se aprecia un grado de incisión, de moderado a fuerte, en dichas formas de drenaje.

SUPERFICIE DE RELLENO: superficie de acumulación de sedimentos provenientes de los relieves circundantes. Presentan, por tanto, morfologías similares a las de una depresión y características propicias al desarrollo del endorreísmo.

SUPERFICIE DISECTADA: superficie con un grado de disección intermedio, de origen fluvial. Es una geoforma exclusiva de la región Costa, donde aparece asociada a una antigua llanura aluvial.

SUPERFICIE DISECTADA, NIVEL INFERIOR: superficie situada topográficamente por debajo de una *superficie de mesa o meseta*, labrada sobre un paquete o nivel de la misma secuencia sedimentaria que ésta. La escorrentía superficial se muestra concentrada y se aprecia un cierto grado de incisión en dichas formas de drenaje.

SUPERFICIE HORIZONTAL: superficie plana o ligeramente ondulada, próxima a la horizontal, de origen incierto o de difícil adscripción genética. Se utiliza, preferentemente, para indicar un rellano horizontal dentro de una ladera, a modo de hombrera.

SUPERFICIE HORIZONTAL DISECTADA: *superficie horizontal*, en que la escorrentía superficial se muestra concentrada y se aprecia un grado de incisión de moderado a fuerte en dichas formas de drenaje.

SUPERFICIE INCLINADA: superficie de perfil longitudinal rectilíneo y cierta inclinación, de origen incierto o de difícil adscripción genética. Se utiliza, preferentemente, para indicar una superficie de menor pendiente dentro de una ladera, a modo de hombrera inclinada; también para una forma de piedemonte sin posibilidad de adscripción a una geoforma más específica.

SUPERFICIE INCLINADA DISECTADA: *superficie inclinada*, en que la escorrentía superficial se muestra concentrada y se aprecia un grado de incisión de moderado a fuerte en dichas formas de drenaje.

SUPERFICIE INTERVENIDA: área alterada de forma artificial, en el que es imposible reconocer o asignar ninguna otra geoforma. Se incluyen en este término, especialmente, embalses y represas, canteras, excavaciones mineras o de otro tipo y rellenos diversos.

SUPERFICIE MUY DISECTADA: superficie con marcado grado de disección, de origen fluvial. Los cauces pueden llegar a encajarse en esta superficie, dando lugar a *barrancos, gargantas* y otras formas de incisión fluvial. Es una geoforma exclusiva de la región Costa, donde aparece asociada a una antigua llanura aluvial.

SUPERFICIE ONDULADA LACUSTRE: geoforma equivalente a *relieve lacustre ondulado*, pero localizada fuera de llanuras aluviales o terrazas fluviales.

SUPERFICIE POCO DISECTADA: superficie de origen fluvial, escasamente disectada, de plana a ondulada. Es una geoforma exclusiva de la región Costa, donde aparece asociada a una antigua llanura aluvial.

SUPERFICIE VOLCÁNICA ONDULADA: superficie de geometría ondulada, desarrollada sobre materiales volcánicos, independiente de la edad, tipo o génesis de los mismos.

SUPERFICIES DE PLANAS A LIGERAMENTE ONDULADAS SOBRE CANGAHUA: plataformas desarrolladas sobre depósitos piroclásticos, principalmente constituidos por cenizas volcánicas y lapilli del Cuaternario, incididas por barrancos que crean taludes y acantilados de muy fuerte inclinación. Son frecuentes en la zona septentrional del corredor interandino.

SUPERFICIES PLANAS INTERVENIDAS: con este término, exclusivo de la región Costa, se designa al área ocupada por camaroneras.

SUPERFICIES Y PLANOS ESTRUCTURALES ORIGINADOS EN CAPAS PLEGADAS: superficies cuya morfología está determinada por el plegamiento de las capas que conforman su sustrato.

-T-

TALUD DE DERRUBIOS: fragmentos rocosos que cubren de forma continua una ladera o una parte considerable de ella. A veces se originan por coalescencia lateral de varios *conos de derrubios*.

TERRAZA ALTA: superficie plana de origen fluvial, que se corresponde con el segundo nivel de terraza por encima del *valle fluvial, llanura de inundación*.

TERRAZA BAJA Y CAUCE ACTUAL (sobreexcavación del cauce en la llanura de inundación): en este proyecto, se considera bajo esta denominación a la franja que bordea e incluye al canal o canales fluviales, sometida a continuos cambios, con alto contenido en bloques y cantos. Se denominan también lechos móviles y forman parte de las llanuras de inundación. Son zonas no aptas para el aprovechamiento agrícola. También se incluyen bajo este término a canales fluviales de considerable anchura, no limitados por geoformas directamente asociadas al drenaje canalizado (es decir, que no discurren en el interior de *valles fluviales/llanuras de inundación, valles en V, gargantas o encañonamientos*) y que, por tanto, son los únicos elementos con los que se puede identificar al medio aluvial actual.

TERRAZA COLGADA: superficie plana de origen fluvial, con la que se designa tanto a aquellos niveles de terrazas que están claramente desconectados del valle fluvial como a niveles de terrazas que están situados topográficamente por encima de la denominada *terrazza alta*.

TERRAZA DE KAME: acumulación de arenas y gravas, que dan lugar a una superficie plana y un abrupto, de canales que discurren entre la pared de un valle glaciar y el borde lateral del hielo.

TERRAZA MEDIA: superficie plana de origen fluvial, que se sitúa inmediatamente por encima del nivel máximo de las aguas de un río (*valle fluvial, llanura de*

inundación), como resultado de la incisión del mismo. Aunque puede ser considerada en sentido estricto como una terraza baja, en este proyecto se ha utilizado esta denominación para guardar coherencia con la denominación utilizada en trabajos previos, del que este proyecto es continuación.

TERRAZAS ESCALONADAS: bajo esta denominación se incluyen dos o más niveles de terrazas que, por su reducido tamaño, no se pueden diferenciar cartográficamente.

TERRAZAS INDIFERENCIADAS: superficies planas de origen fluvial, en las que no se puede determinar el nivel del que se trata (*terrazza media, terraza alta, o terraza colgada*) y que, por tanto, no se pueden clasificar en ningún otro tipo. Bajo esta denominación también se incluyen las terrazas erosivas o terrazas rocosas, un tipo particular de terraza labrada sobre material rocoso.

TESTIGO DE CONO DE DEYECCIÓN: parte aislada o separada de un cono de deyección, que no conserva la morfología en planta característica de los mismos (ver *superficie de cono de deyección*). Puede presentar diferentes grados de disección en superficie.

TESTIGO DE CONO DE ESPARCIMIENTO: parte aislada o separada de un cono de esparcimiento, o que ya no conserva la morfología en planta característica de los mismos (ver *superficie de cono de esparcimiento*). Puede presentar diferentes grados de disección en superficie.

TESTIGO DE GLACIS DE ESPARCIMIENTO: parte de un *glacis de esparcimiento*, que no conserva completa la superficie entre el relieve del que procede y la llanura con la que originalmente enlazaba. Puede presentar diferentes grados de disección en superficie.

TOR: tipo particular de *inselberg*, con bloques apilados y fragmentados, cuya morfología está controlada por los sistemas de fracturación del macizo rocoso. Son más frecuentes en rocas de tipo granítico, aunque también pueden llegar a aparecer en otras litologías.

-V-

VALLE CIEGO: valle cuyo curso de agua superficial desaparece en un sumidero kárstico.

VALLE EN SACO: cabecera de valle, con aspecto de circo, en que el aporte de agua procede de un manantial kárstico.

VALLE EN V: valle fluvial con perfil transversal en forma de V, en que predomina la incisión vertical.

VALLE FLUVIAL, LLANURA DE INUNDACIÓN: franja de terreno asociada directamente a la dinámica fluvial y constituida por depósitos aluviales. Suele

discurrir en su interior un canal fluvial y el terreno que abarca está sometido, parcial o totalmente, a inundaciones con diferentes periodos de retorno.

VALLE GLACIAR COLGADO: valle glaciar en que la excavación producida por el hielo ha sido menor que la del valle glaciar principal en que desemboca o desembocaba, quedando su fondo a mayor altura.

VALLE INDIFERENCIADO: valle de fondo plano o de sección ligeramente en "U", con ausencia de dinámica fluvial permanente. Presenta un relleno de depósitos aluviales en los que el agua tiende a percolar y, en consecuencia, la escorrentía superficial tiene un escaso desarrollo.

VERTIENTE ABRUPTA: ladera con escasa disección y con pendiente habitualmente superior al 70%.

VERTIENTE ABRUPTA CON FUERTE DISECCIÓN: *vertiente abrupta*, en la que se aprecia una marcada disección en la totalidad o en gran parte de la geoforma.

VERTIENTE ABRUPTA DE DERRAMES VOLCÁNICOS TABULARES: tipo particular de *vertiente de meseta volcánica*, de perfil rectilíneo y pendiente pronunciada, que conecta tanto las zonas altas de Sierra con modelado glaciar -y los paisajes de Páramos- con las Vertientes externas de la Cordillera así como con las Vertientes y relieves superiores de las Cuencas Interandinas, con desniveles de hasta 400 metros.

VERTIENTE DE CHEVRON: ladera sobre la que culmina una *superficie de chevron*. Ambas geoformas están separadas por un *frente de chevron*, que puede ser o no mapeable.

VERTIENTE DE CUESTA: ladera sobre la que culmina una *superficie de cuesta*. Ambas geoformas están separadas por un *frente de cuesta*, que puede ser o no mapeable.

VERTIENTE DE CUESTA MARINA: ladera sobre la que culmina una *superficie de cuesta marina*. Ambas geoformas están separadas por un *escarpe de cuesta marina*, que puede ser o no mapeable.

VERTIENTE DE LLANURA DE DEPÓSITOS FLUVIO-LACUSTRES: escarpe o escalón morfológico que puede aparecer en una *llanura de depósitos fluvio-lacustres*.

VERTIENTE DE LLANURA DE DEPÓSITOS VOLCÁNICOS: escarpe o escalón morfológico que puede aparecer en una *llanura de depósitos volcánicos*.

VERTIENTE DE MESA MARINA: ladera sobre la que culmina una *superficie de mesa marina* o una *superficie de mesa marina disectada*. Ambas geoformas, vertiente y superficie, están separadas por un *escarpe de mesa marina*, que puede ser o no mapeable.

VERTIENTE DE MESA O MESETA: ladera sobre la que culmina una *superficie de mesa o meseta* o una *superficie de mesa o meseta disectada*. Ambas geoformas,

vertiente y superficie, están separadas por una *cornisa de mesa*, que puede ser o no mapeable.

VERTIENTE DE MESETA VOLCÁNICA: ladera culminada por una *superficie de meseta volcánica* o una *superficie de meseta volcánica disectada*. Ambas geoformas, vertiente y superficie, están separadas por una *cornisa de meseta volcánica*, que puede ser o no mapeable.

VERTIENTE DE PLANICIE INTERMONTANA: ladera que culmina en una *planicie intermontana*.

VERTIENTE DE SUPERFICIE DE EROSIÓN: ladera que culmina en una *superficie de erosión*.

VERTIENTE DE SUPERFICIE DE RELLENO: ladera de una *superficie de relleno*, formada por los mismos materiales de ella.

VERTIENTE DE VALLE GLACIAR: ladera de pendiente pronunciada, límite con el *fondo de valle glaciario*.

VERTIENTE HETEROGÉNEA: ladera de perfil mixto (cóncavo-convexo, rectilíneo-cóncavo, etc.) o irregular, escasamente disectada.

VERTIENTE HETEROGÉNEA CON FUERTE DISECCIÓN: ladera de perfil mixto (cóncavo-convexo, rectilíneo-cóncavo, etc.) o irregular, en la que se aprecia una marcada disección en la totalidad o en gran parte de la geoforma.

VERTIENTE O ABRUPTO DE LLANURA ANTIGUA: escarpe morfológico proporcionado por la antigua llanura aluvial de la región Costa. Está, por tanto, asociada a las geoformas *superficie poco disectada*, *superficie disectada* y *superficie muy disectada*.

VERTIENTE O ABRUPTO DE TERRAZA: se refiere al escarpe o escalón que caracteriza a cualquier tipo de terraza y que enlaza la superficie de un determinado nivel de terraza con el inmediatamente inferior o con la llanura aluvial.

VERTIENTE RECTILÍNEA: ladera de perfil longitudinal predominantemente rectilíneo, con escasa o nula disección.

VERTIENTE RECTILÍNEA CON ABRUPTOS: ladera de perfil longitudinal predominantemente rectilíneo, con presencia de una o más zonas de rotura de la pendiente, en las que se produce un incremento brusco de la inclinación general de la ladera.

VERTIENTE RECTILÍNEA CON FUERTE DISECCIÓN: ladera de perfil longitudinal predominantemente rectilíneo, en la que se aprecia una marcada disección en la totalidad o en gran parte de la geoforma.

VERTIENTE RECTILÍNEA CON SALIENTES ROCOSOS: ladera de perfil longitudinal predominantemente rectilíneo, en la que aparecen salientes rocosos dispersos que irregularizan la superficie de la vertiente.

VERTIENTE ROCOSA: ladera mayoritaria o totalmente rocosa, con muy baja presencia de suelo. No se incluyen en este término las vertientes rocosas de carácter estructural (ejemplos: *superficie de cuesta; superficie de chevron; barra o cresta estructural; resto de superficie estructural; superficies y planos estructurales originados en capas plegadas*).

VESTIGIOS DE EDIFICIOS VOLCÁNICOS: restos de estratovolcanes. El edificio volcánico es difícilmente reconocible o sólo se conserva una parte del mismo.

-Y-

YARDANGS: formas creadas por la erosión del viento en ambientes desérticos, que a veces se asemejan a las del casco de un barco invertido. De dimensiones muy variables, suelen presentarse agrupados, con sus ejes mayores paralelos a la dirección de los vientos dominantes. Se desarrollan en una gran variedad de sustratos litológicos e incluso en arenas eólicas.

ANEXO IV. ATRIBUTOS DE LAS GEOFORMAS

En el presente anexo se recoge una síntesis de las características y rangos de los diferentes atributos que se asignan a todas y cada una de las geoformas. Los primeros (Región, Dominio Fisiográfico y Contexto Morfológico) se refieren al encuadre en que se localiza cada una de las geoformas, dentro del sistema jerárquico de relieve adoptado. El resto (génesis, atributos geológicos, morfológicos, morfométricos y relacionados con el drenaje) describen diferentes aspectos que caracterizan o son inherentes a la geoforma identificada.

Se han elaborado, a lo largo de la realización del proyecto, un conjunto de procedimientos y manuales que forman parte de la metodología de la temática de Geomorfología y están disponibles para su consulta. En dichos documentos se desarrollan y complementan, entre otros, diferentes aspectos contemplados en el presente anexo.


1. Atributos relacionados con el sistema de jerarquía del relieve: Región, Dominio Fisiográfico y Contexto Morfológico

El relieve y el paisaje físico se pueden concebir a través de un sistema que, en función de la escala espacial de referencia, permite distinguir áreas o unidades con características comunes y diferenciables de las contiguas a dicha escala de observación.

El sistema de jerarquización establecido se basa en el trabajo "Los paisajes naturales del Ecuador. Las regiones y paisajes del Ecuador" (Winckell, 1997). A partir de él se han realizado las necesarias adaptaciones para conseguir un modelo coherente y eficaz para los objetivos del trabajo de cartografía geomorfológica y geopedológica.

Los órdenes de jerarquía establecidos, del más general al de mayor detalle, son Región, Dominio Fisiográfico y Contexto Morfológico. Las Geoformas, unidades básicas de mapeo, representan el vértice superior de esta jerarquía (Figura IV.1). La agrupación espacial de un conjunto de geoformas adyacentes con ciertas características comunes (cobertura o no de depósitos piroclásticos, predominio de un sustrato geológico común, tipo de modelado o génesis que presentan, etc.) configura un determinado contexto.

Figura IV.1. Órdenes del sistema de jerarquía adoptado y significado



Fuente: CTN

Cada uno de estos órdenes o niveles se definen a continuación.

Región: Una Región, o sistema geoestructural, puede definirse como una gran unidad geomorfológica resultante de la evolución geológica y tectónica del área en que se encuadra, en la que se manifiestan características del medio físico comunes a todo el amplio territorio incluido en ella. Una Región, típicamente con una extensión del orden de 10^4 a 10^5 km², presenta, a esa escala de análisis, particularidades del relieve condicionadas por las grandes estructuras geológicas (accidentes tectónicos y plegamientos mayores) y su evolución a lo largo del tiempo.

Las tres regiones del Ecuador continental son Costa, Sierra y Amazonía.

Dominio Fisiográfico: Unidad territorial, que agrupa uno o más Contextos Morfológicos, característica de un determinado ambiente morfoclimático (p. ej., ambiente glaciar-periglacial) o sistema morfogenético (p.ej., volcánico, litoral, aluvial); su diferenciación también se establece, a menudo, en base a unidades tectónicas y estructurales (p.ej., vertientes externas de las cordilleras, paisajes estructurales, grandes sistemas de piedemonte). Representan, en definitiva, un tipo de características del relieve que se diferencian claramente del espacio adyacente y que se localizan en un marco geográfico definido, continuo y de considerable extensión, del orden de 10^3 a 10^4 km².

Para el conjunto de la zona de estudio del proyecto, se han considerado ocho dominios fisiográficos en la región Costa, siete dominios fisiográficos en la región Sierra y tres dominios fisiográficos en la región Amazonía.

Contexto Morfológico: Territorio con características comunes en cuanto al tipo general de modelado y fisiografía, en el que suele predominar un tipo de sustrato geológico o de formación superficial y muy a menudo caracterizado complementariamente por la presencia generalizada o por la ausencia de cobertura piroclástica. Su extensión fluctúa en órdenes de magnitud de entre 10^2 a 10^3 km².

Agrupan siempre a distintas geoformas, algunas de las cuales son más frecuentes o características del Contexto Morfológico definido. Los contextos pueden hacer referencia, por ejemplo, a vertientes o relieves estructurales sobre determinadas litologías, a construcciones de tipo estrato-volcán, a piedemontes proximales o piedemontes distales con o sin cobertura piroclástica, o a vertientes homogéneas sobre granitos sin cobertura piroclástica.

Los Contextos Morfológicos, incorporados para cada Dominio Fisiográfico, suponen un total de cincuenta y uno para el conjunto de la zona de estudio del proyecto.

En el Cuadro IV.1 se muestran todos los Contextos Morfológicos de cada Dominio Fisiográfico y Región.

Cuadro IV.1. Regiones, Dominios Fisiográficos y Contextos Morfológicos considerados en el área de estudio.

REGIÓN SIERRA	
DOMINIO FISIOGRAFICO:VERTIENTES EXTERNAS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL	
CONTEXTOS MORFOLÓGICOS	Relieves diversificados sobre materiales volcánicos antiguos, con cobertura piroclástica (Cordillera Occidental)
	Relieves diversificados sobre materiales volcánicos antiguos, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental)
	Zonas deprimidas o abrigadas y primeras estribaciones de la vertiente occidental, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental)
	Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura piroclástica (Cordillera Occidental)
	Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental)
	Vertientes de carácter estructural sobre rocas volcano-sedimentarias y metamórficas, con cobertura piroclástica (Cordillera Occidental)
	Cuencas deprimidas con relieves colinares sobre rellenos volcano-sedimentarios, con cobertura piroclástica (Cordillera Occidental)
	Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental)
	Relieves y estribaciones meridionales de la vertiente occidental, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental)

DOMINIO FISIAGRÁFICO: VERTIENTES EXTERNAS DE LA CORDILLERA REAL	
CONTEXTOS MORFOLÓGICOS	Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, con cobertura piroclástica (Cordillera Real)
	Relieves escarpados sobre rocas metamórficas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)
	Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura piroclástica (Cordillera Real)
	Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Real)
DOMINIO FISIAGRÁFICO: CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL	
CONTEXTOS MORFOLÓGICOS	Paisajes glaciares
	Paisajes de páramo con modelado periglacial y huellas glaciares poco marcadas
	Paisajes de páramo con modelado eólico
	Relieves de los márgenes de las cimas frías
DOMINIO FISIAGRÁFICO: SISTEMA VOLCÁNICO	
CONTEXTOS MORFOLÓGICOS	Vestigios de edificios volcánicos muy destruidos, difícilmente identificables
	Construcciones de tipo estrato-volcán y formas asociadas
DOMINIO FISIAGRÁFICO: VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS INTERANDINAS	
CONTEXTOS MORFOLÓGICOS	Vertientes y relieves superiores de las cuencas interandinas, con cobertura piroclástica (Sierra Norte)
	Vertientes y relieves superiores de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierras Central y Meridional)
	Macizos internos de la Sierra Sur sobre litología indiferenciada, sin cobertura piroclástica
	Macizos internos de la Sierra Sur sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica
	Vertientes y relieves inferiores de las cuencas interandinas, con cobertura piroclástica. Sierra Norte
	Vertientes y relieves inferiores de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica. Sierra Sur
DOMINIO FISIAGRÁFICO: RELIEVES DE FONDO DE CUENCAS INTERANDINAS	
CONTEXTOS MORFOLÓGICOS	Relieves de fondo de cuencas interandinas con rellenos volcano-sedimentarios y piroclásticos
	Relieves de fondo de cuencas interandinas sin cobertura piroclástica

DOMINIO FISIOGRAFICO: MEDIO ALUVIAL DE SIERRA	
CONTEXTO MORFOLÓGICO	Medio aluvial de Sierra
REGIÓN AMAZONÍA	
DOMINIO FISIOGRAFICO: ZONA SUBANDINA	
CONTEXTOS MORFOLÓGICOS	Cordillera del Napo: paisajes estructurales, calcáreos y relieves periféricos, con cobertura de cenizas volcánicas
	Cordillera del Cutucú: relieves sobre rocas calcáreas y areniscas, con y sin formas estructurales. Sin cobertura de cenizas volcánicas
	Cordillera del Cóndor: relieves accidentados principalmente sobre granitos y modelado estructural sobre areniscas. Sin cobertura de cenizas volcánicas
	Corredores, depresiones (Cosanga, Limón-Gualaquiza y Zumba) y vertientes bajas marginales
	Estribaciones orientales subandinas: relieves sobre arcillas y areniscas (parcialmente fosilizadas por las formaciones de piedemonte)
DOMINIO FISIOGRAFICO: AMAZONIA PERIANDINA	
CONTEXTOS MORFOLÓGICOS	Piedemontes próximos, con cobertura de cenizas volcánicas recientes
	Piedemontes distales, sin cobertura de cenizas volcánicas
	Colinas periandinas occidentales
	Colinas periandinas orientales
DOMINIO FISIOGRAFICO: MEDIO ALUVIAL AMAZÓNICO	
CONTEXTO MORFOLÓGICO	Medio aluvial amazónico
REGIÓN COSTA	
DOMINIO FISIOGRAFICO: RELIEVES ESTRUCTURALES SOBRE SEDIMENTOS TERCIARIOS	
CONTEXTO MORFOLÓGICO	Mesas muy disectadas y restos de relieves tabulares sobre limolitas y areniscas culminantes
DOMINIO FISIOGRAFICO: GRAN CONO TABULAR DE LA LLANURA COSTERA Y LLANURA ALUVIAL ANTIGUA	
CONTEXTOS MORFOLÓGICOS	Gran cono tabular de la llanura costera
	Testigos disectados de depósitos aluviales encaramados
	Llanura aluvial antigua
	Superficies onduladas y transición a la llanura aluvial reciente

DOMINIO FISIOGRAFICO: PIEDEMONTE ANDINO OCCIDENTAL	
CONTEXTOS MORFOLÓGICOS	Conos de esparcimiento y formas de piedemonte proximales, en contacto con la vertiente andina occidental
	Conos de esparcimiento y formas de piedemonte distales, planos a poco disectados
DOMINIO FISIOGRAFICO: PIEDEMONTE COSTERO	
CONTEXTO MORFOLÓGICO	Glacis de los piedemontes costeros
DOMINIO FISIOGRAFICO: BAJA LLANURA ALUVIAL INUNDABLE DE LA COSTA	
CONTEXTO MORFOLÓGICO	Llanura aluvial reciente
DOMINIO FISIOGRAFICO: MEDIO ALUVIAL COSTERO	
CONTEXTO MORFOLÓGICO	Medio aluvial costero
DOMINIO FISIOGRAFICO: CORDILLERAS COSTERAS SOBRE ROCAS VOLCÁNICAS ANTIGUAS	
CONTEXTO MORFOLÓGICO	Cerros testigos de la llanura aluvial reciente
DOMINIO FISIOGRAFICO: MEDIO LITORAL	
CONTEXTOS MORFOLÓGICOS	Llanura y depresión costera de Arenillas
	Formas y depósitos fluvio-marinos

Fuente: CTN, basada en Winckell, 1997

Cada uno de los Contextos Morfológicos definidos pertenece a un solo Dominio Fisiográfico. Y, a su vez, cada Dominio Fisiográfico, está incluido en una sola región. De esta forma, determinando el Contexto Morfológico en que se incluye un conjunto de geoformas espacialmente contiguas quedan directamente asignados los niveles superiores de la jerarquía.

Tres aspectos deben tenerse especialmente en cuenta para la delimitación de un Contexto Morfológico:

- Muchas geoformas no son exclusivas de un Contexto Morfológico concreto (p.ej., coluviones, vertientes, formas poligénicas, etc.).
- Aunque hay formas más características y/o abundantes de un determinado contexto (p.ej., formas y depósitos glaciares en *Paisajes glaciares* o en *Paisajes de páramo con modelado glaciar y huellas glaciares poco marcadas*), pueden aparecer en otros Contextos Morfológicos (en el caso anterior, por ejemplo, por tratarse de formas paleoclimáticas heredadas).
- Los contextos morfológicos se conciben como áreas de continuidad cartográfica, favoreciendo que no existan "islas" pequeñas de otros Contextos Morfológicos en su interior.

El último escalón en esta jerarquía, de menor amplitud geográfica y mayor especificidad en su definición, está ocupado por el orden correspondiente a las geoformas.

Una **Geoforma** (o Unidad Geomorfológica) se puede definir como una porción del territorio, identificable con respecto a las de su entorno inmediato desde el punto de vista perceptivo, que presenta características homogéneas en cuanto a su génesis (procesos formadores), morfología (forma del terreno), morfometría (o análisis cuantitativo del relieve: pendiente, desnivel relativo, longitud de vertiente), procesos morfodinámicos actuantes y material constitutivo (formación geológica o depósito superficial sobre la que se asienta).

Son las unidades básicas de mapeo. El tamaño mínimo para su representación es de 1 hectárea, con órdenes típicos de magnitud de entre 5 a 10 hectáreas hasta 10² km² para las geoformas mayores.

Una Geoforma debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Es fácilmente reconocible, tanto a partir de imágenes aéreas adecuadas que permitan la visión tridimensional como en el propio terreno.
- Sus límites representan cambios netos en las características del relieve o, cuando no son suficientemente claros, se determinan a partir del cambio en ciertos parámetros que no siempre tienen expresión en la morfología (formaciones geológicas subyacentes, por ejemplo).
- Sus dimensiones son convenientes para la escala del mapa y para el estudio edafológico posterior, de tal manera que proporcionan una información adecuada para este objetivo y no se crean multitud de recintos o polígonos de escaso significado.

Ejemplos de geoformas (o unidades geomorfológicas) son: valle en V; superficie de cono de esparcimiento; relieve lacustre ondulado; coluvión reciente; fondo de valle glaciar; rampa de piedemonte de cono volcánico; cordón litoral; aplanamiento kárstico; colinas en media naranja; manto eólico; superficie de cuesta; relieve colinado medio; superficie horizontal disectada; superficie intervenida.

1.1. Justificación del sistema de jerarquía de relieve adoptado

Los órdenes de jerarquía adoptados suponen un cambio con respecto a la sistemática llevada a cabo en la cartografía geomorfológica realizada por el Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE (exCLIRSEN), cuyos trabajos son predecesores de éste. Dicho organismo, para encuadrar las geoformas en un nivel superior de cierta homogeneidad, sólo consideró a las que denominó Unidades Ambientales, sin otros niveles o escalones. La modificación llevada a cabo en el presente proyecto supone una estructuración de la información geomorfológica en varios niveles jerárquicos (Contexto Morfológico, Dominio Fisiográfico y Región), que atienden a una categorización del relieve en función de la escala de análisis y que, por tanto, contribuye a una mejor comprensión del mismo.

Por otra parte, aunque las anteriormente denominadas Unidades Ambientales equivalen, en algunos casos, a los designados en este trabajo como Contextos Morfológicos (por ejemplo, Relieves de los márgenes de las cimas frías era una Unidad Ambiental y ahora es considerado un Contexto Morfológico, con idéntico nombre), existen otras situaciones en que dichas Unidades Ambientales parecen ajustarse mejor a una categoría de mayor amplitud geográfica, el Dominio Fisiográfico. Es el caso, por ejemplo, de la Unidad Ambiental Vertientes externas de la Cordillera Real, que en este trabajo ya es tratado como Dominio Fisiográfico, en el que se incluyen cuatro diferentes Contextos Morfológicos.

2. Atributo relacionado con la génesis de la geoforma

El grupo genético indica el tipo general de modelado característico de cada tipo de geoforma. Una denominación de geoforma siempre se atribuye, por tanto, a un determinado grupo genético.

Las principales características de los trece grupos genéticos se sintetizan en el Cuadro IV.2.

Cuadro IV.2. Grupos genéticos y características de los mismos

GRUPO GENÉTICO	CARACTERÍSTICAS GENERALES
Fluvial	Formas y depósitos ligados a ríos y al flujo de agua habitualmente encauzada. También se incluyen formas resultantes de la erosión generalizada por agua
Fluvio-lacustre	Formas y depósitos ligados a lagos, lagunas y áreas endorreicas, incluyendo depresiones con acumulación de agua esporádica, temporal o permanente
Laderas	Formas y depósitos relacionados con la evolución y dinámica de las laderas o vertientes
Glaciar y periglacial	Formas y depósitos producidos por la acumulación de hielo (glaciares) y en las zonas de su periferia o en las que dominan los ciclos de hielo y deshielo del terreno y/o la existencia de permafrost (periglaciares)
Volcánico	Formas y depósitos tanto asociados directa o indirectamente a edificios volcánicos recientes como relieves que aparecen sobre sustrato volcánico
Marino	Formas y depósitos relacionados tanto con la dinámica litoral actual y reciente, como formas relacionadas con depósitos marinos antiguos
Kárstico	Formas desarrollados principalmente sobre rocas calcáreas (calizas, dolomías, calcarenitas) y evaporítico-salinas, con un característico modelado
Meteorización	Formas características producto de una intensa meteorización química
Eólico	Formas y depósitos producidos por la acción del viento
Estructural	Modelados resultantes de la interacción entre los diversos procesos erosivos y la litología y estructura de las rocas

Tectónico-erosivo	Formas sin rasgos característicos (geofomas banales), no ligadas a ningún sustrato litológico concreto, de cierta extensión y continuidad. Las geofomas incluidas en este grupo han sido modeladas por una erosión relativamente uniforme en su conjunto, generalmente sobre materiales que habían sido con anterioridad elevados tectónicamente
Poligénicas	Formas y depósitos que tienen su origen en dos o más grupos genéticos o que son de difícil adscripción a uno de ellos
Otras	Se incluyen en este grupo geofomas de definición poco precisa, difícilmente representables por sus propias características y modo de aparición o áreas de fuerte intervención antrópica que impiden reconocer la geofoma original o representarla

Fuente: CTN

3. Atributos geológicos: formación geológica y litología

Una *formación geológica* (sensu stricto) es una unidad litoestratigráfica constituida por un conjunto de rocas claramente diferenciables de las adyacentes o próximas por sus características litológicas, suficientemente distintivas como para permitir esa diferenciación. Las *formaciones geológicas* (sensu stricto) se definen en su localidad tipo (de donde, generalmente, reciben su nombre: Formación Tarqui, Formación Tena). Además de caracterizarlas por la litología, se describe su contenido paleontológico si es el caso (que permitirá encuadrarlas en la escala cronoestratigráfica), potencia, extensión y variación lateral, así como sus relaciones con otras formaciones geológicas supra e infrayacentes.

La unión de dos o más *formaciones geológicas* contiguas asociadas, que presentan un cierto número de características litológicas comunes, se denomina *grupo* (sensu stricto). Las *formaciones geológicas*, por su parte, se pueden dividir, total o parcialmente, en unidades de rango menor, llamadas *miembros*.

Cuando estos cuerpos rocosos, a pesar de que hayan podido ser considerados por algunos autores como *formaciones geológicas*, *miembros* o *grupos*, no cumplen con los criterios seguidos internacionalmente para considerarlos bajo tales denominaciones, la tendencia es utilizar el término genérico de "unidad".

En este trabajo se considera el término "formación geológica" en sentido amplio, o informal: se incluyen en esta categoría general las *formaciones geológicas*, *grupos* y "unidades" que así fueron consideradas en la cartografía geológica utilizada como referencia o insumo principal (cartografía geológica 1:100.000 o 1:250.000 proporcionada por el INIGEMM al inicio de este proyecto, en febrero de 2014).

También se incluyen bajo esta categoría diferentes tipos de *formaciones* o *depósitos superficiales*: una formación o depósito superficial es un cuerpo sedimentario, de espesor limitado, normalmente del orden de la decena de metros, que recubre el sustrato geológico, sin guardar relación geométrica con él; habitualmente están poco

o nada consolidados y/o compactados y pertenecen al Cuaternario (<1,8 millones de años). Ejemplos de formaciones superficiales son: depósitos aluviales; depósitos coluviales; depósitos glacio-lacustres. Otras formaciones superficiales pueden denominarse, incluso, con el nombre de una localidad o topónimo donde aparecen y su litología o tipo litológico dominante (por ejemplo, ceniza del Tungurahua o volcano-sedimentos del Quilotoa).

Bajo estas consideraciones, para toda el área de estudio se han establecido un total de 236 formaciones geológicas (en sentido amplio del término) para el total del área de estudio. A cada una de estas formaciones se les ha asociado una descripción litológica, de acuerdo a la que aparece en las cartografías geológicas anteriormente referidas, completando y contrastando dicha descripción con los principales léxicos estratigráficos del país disponibles en el momento de establecer estas relaciones (Bristow y Hoffstetter, 1977; Duque, 2000).

La asignación de los atributos "formación geológica" y "litología" se realiza, por tanto, a través del primero de estos atributos. Aunque la referencia principal es la cartografía geológica 1:100.000 (o 1:250.000) del INIGEMM u organismos predecesores, también se utilizan como insumos otras cartografías geológicas (ver apartado 2.2.1.2. Insumos complementarios, de la Memoria) cuando se deduce que éstas son de mejor calidad o precisión. Asimismo, se realizan modificaciones cuando existen evidencias, en campo o mediante la propia fotointerpretación, de una "formación geológica" concreta diferente a la proporcionada por cualquiera de los insumos geológicos.

En el Cuadro IV.3 se muestran algunos ejemplos de formaciones geológicas o depósitos superficiales, con el código asignado y la descripción del tipo de roca o sedimento.

Cuadro IV.3. Ejemplos de formaciones geológicas o depósitos superficiales, símbolos asignados y descripción litológica correspondiente

FORMACIÓN GEOLÓGICA O DEPÓSITO SUPERFICIAL	(*)	DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ROCA O SEDIMENTO
Depósitos de ladera	Q_{dl}	Gravas y bloques de angulosos a subangulosos, con o sin mezcla irregular y en proporciones variables de elementos finos (limos, arcillas y arenas)
Volcano-sedimentos del Quilotoa	Q_{dvQ}	Tobas bien estratificadas, con frecuente carácter lacustre y alternantes con cenizas y lapilli
Conglomerados Zarapullo	P_{za}	Guijarros y cantos rodados pobremente estratificados en matriz areno-limosa
Formación Borbón	PI_B	Areniscas de grano grueso en bancos, con intercalaciones de argilita y conglomerados en la base
Formación Mangán	Mio_{Mn}	Limolitas, lutitas y areniscas de grano fino interestratificadas; lutitas con vetas de carbón; areniscas de grano grueso y conglomeráticas
Formación Playa Rica	Ole_r	Lutitas grises o negras laminadas, con intercalaciones de areniscas
Formación Ostiones	Eo_{os}	Lutitas duras, grises a pardas; tobas y arcillas silíceas hacia muro
Formación Tiyuyacu	Pal_{Ty}	Conglomerado de cuarzo, lutita y chert en matriz areno-limosa; areniscas con intercalaciones de lutitas rojas, grises y verdes
Grupo Alamor	M_{al}	Lutitas, areniscas, arcillas y limos estratificados, localmente con ligero metamorfismo
Batolito de Zamora	J_{abs}	Granitoides
Unidad Piedras	Pz_{pi}	Anfibolitas gneísicas de grano fino a grueso y esquistos verdes
Granito de Abitagua	IN G_{Ab}	Granito (monzogranito de biotita, de grano grueso y color rosado)
Gabro	IN G_a	Gabro

Fuente: CTN, a partir de: cartografías geológicas oficiales 1: 100.000 y 1:250.000 del INIGEMM y organismos predecesores; Bristow y Hoffstetter, 1977

(*) Nota: Los símbolos empleados para cada una de las formaciones geológicas o depósitos superficiales no tienen carácter oficial, aunque para ello se ha tenido en cuenta la simbología utilizada en publicaciones de amplio reconocimiento y uso: hojas geológicas 1:100.000 y 1:250.000 publicadas por el INIGEMM u organismos predecesores y Léxico estratigráfico del Ecuador (Bristow y Hoffstetter, 1977). Especialmente para depósitos superficiales y otros

grupos litológicos que no tienen reconocimiento de formación, así como para ciertas formaciones geológicas, se ha acordado la adopción de códigos propios, siguiendo criterios análogos a los utilizados en dichos trabajos de referencia.

En los códigos la primera o primeras letras hacen referencia a la edad: Q= Cuaternario, P=Pleistoceno, Pl=Plioceno, Mio=Mioceno, Oli=Oligoceno, Eo= Eoceno, Pal=Paleoceno, K=Cretácico, J=Jurásico, Pz=Paleozoico, mientras que los subíndices se refieren al tipo de depósito superficial (dl=depósitos de ladera; dvQ=depósitos volcánicos del Quilotoa) o al nombre de la "formación geológica" (za=Zarapullo; Bb=Borbón; Mn=Mangán, etc.). Los símbolos que inician su denominación con IN se refieren a cuerpos intrusivos sin asignación de edad.

4. Atributos morfológicos: forma de la cima, de la vertiente y del valle

Los atributos morfológicos, de carácter descriptivo, hacen referencia a variables que ayudan a describir la forma del relieve de la unidad geomorfológica delimitada. Se incluyen los siguientes (Cuadro IV.4):

- Forma de la cima
- Forma de la vertiente
- Forma del valle

Cuadro IV.4. Categorías de formas de cima, vertiente y valle

FORMA DE LA CIMA	FORMA DE LA VERTIENTE	FORMA DEL VALLE
Aguda	Cóncava	En U
Redondeada	Convexa	En V
Plana	Rectilínea	Plano
Otras	Mixta	Otras
No Aplicable	Irregular	No Aplicable
	Otras	
	No Aplicable	

Fuente: CLIRSEN, 2012

5. Atributos morfométricos: desnivel relativo, longitud de vertiente y pendiente

Los atributos morfométricos se refieren a variables susceptibles de medida y que contribuyen a caracterizar el recinto o polígono identificado desde el punto de vista del análisis cuantitativo del relieve que proporciona la geoforma. Los atributos de este tipo son:

- Desnivel relativo
- Longitud de vertiente
- Pendiente

La asignación de todos estos atributos está automatizada, tal como se explica en el documento "Atributos de las geoformas, asignación de atributos y sistema de validación", en base a los datos que proporciona el MDT. No obstante, el fotointérprete los puede modificar si considera que no se ajustan a lo observado o son de carácter anómalo o inexacto.

El *desnivel relativo* corresponde a la altura existente entre la parte más baja, generalmente el cauce de los ríos, quebradas o incisiones (nivel base) y la parte más alta de las unidades geomorfológicas (CLIRSEN, 2012). Las categorías o rangos establecidos son las que se muestran en el Cuadro IV.5.

Cuadro IV.5. Categorías de desnivel relativo

CLASE	DESNIVEL RELATIVO
1	0 - 5 m
2	>5 - 15 m
3	>15 - 25 m
4	>25 - 50 m
5	>50 - 100 m
6	>100 - 200 m
7	>200 - 300 m
8	>300 m
NO APLICABLE	

Fuente: CLIRSEN, 2012

La *longitud de vertiente* corresponde a la distancia inclinada existente entre la parte más alta y la más baja de una unidad geomorfológica (IEE, 2012). Las categorías o rangos establecidos se muestran en el Cuadro IV.6.

Cuadro IV.6. Categorías de longitud de vertiente

CLASE	TIPO	LONGITUD DE VERTIENTE
1	Muy corta	< 15 m
2	Corta	>15-50 m
3	Moderadamente larga	>50-250 m
4	Larga	>250-500 m
5	Muy larga	>500 m
NO APLICABLE		

Fuente: CLIRSEN, 2012

La *pendiente* es el grado de inclinación de las geoformas, con relación a la horizontal, expresado en porcentaje (IEE, 2012). Se han establecido diez clases o rangos de pendientes de pendiente (Cuadro IV. 7).

Cuadro IV.7. Categorías de pendiente

CLASE	TIPO	PENDIENTE (%)
1	Plana	0-2
2	Muy suave	>2 - 5
3	Suave	>5 - 12
4	Media	>12 - 25
5	Media a fuerte	>25 - 40
6	Fuerte	>40 - 70
7	Muy fuerte	>70 - 100
8	Escarpada	> 100 - 150
9	Muy escarpada	> 150 - 200
10	Abrupta	> 200
NO APLICABLE		

Fuente: CLIRSEN, 2012

6. Atributos relacionados con el drenaje

Son dos las variables o atributos que se refieren al drenaje: la forma de drenaje y la densidad de drenaje. Ambas variables proporcionan información indirecta sobre el sustrato (litología y estructura) y/o el tipo de modelado al que está, o ha estado, sometida la geoforma. Las categorías consideradas para cada uno de estos atributos se recogen en los Cuadros IV.8 y IV.9.

La forma de drenaje se asigna por fotointerpretación, mientras que la densidad de drenaje (relación entre la longitud total de cauces que atraviesan un área dada y la

superficie de dicha área: Horton, 1945; Strahler, 1952; Strahler, 1954) se obtiene automáticamente.

Las herramientas para generar la red de drenaje son ArcGIS 10, ArcHydro y ETGeowizard.

Cuadro IV.8. Categorías de tipo de drenaje

TIPOS DE DRENAJE
Dendrítico
Subdendrítico
Anastomosado
Meándrico
Paralelo
Enrejado
Rectangular
Angular
Radial
Asimétrico
Subparalelo
Pinnado
Otras
No Aplicable

Fuente: CLIRSEN, 2012

Cuadro IV.9. Categorías de densidad de drenaje

CLASE O TIPO	DENSIDAD
Drenaje grueso (baja densidad)	<5 km/km ²
Drenaje medio (media densidad)	5-12 km/km ²
Drenaje fino (alta densidad)	>12 km/km ²
NO APLICABLE	

Fuente: CTN

Bibliografía citada en el anexo

Bristow, C.R., y Hoffstetter, R., 1977. Lexique Stratigraphique International, vol. V. Amérique Latine, Fasc. 5 a 2: Ecuador. *Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)*. París, 410 p.

CLIRSEN, 2012. Proyecto: "Generación de Geoinformación para la gestión del territorio a nivel nacional, escala 1:25.000". Geomorfología. Metodología (versión 2012). *Informe no publicado*. Quito, 36 p.

CODIGEM-BGS (Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico Minero Metalúrgica; British Geological Survey), 1993. Mapa Geológico del Ecuador, esc. 1:1.000.000. *CODIGEM*. Quito.

DGGM-IGS (Dirección General de Geología y Minas; Institute of Geological Sciences), 1982. Mapa Geológico del Ecuador, esc. 1:1.000.000. *DGGM*. Quito.

Duque, P., 2000. Léxico Estratigráfico del Ecuador. *CODIGEM*. Quito, 102 p.

Horton, R.E., 1945. Erosional development of streams and their drainage basis; hydrophysical approach to quantitative morphology. *Geol. Soc. Am. Bull.*, 56, 275-370.

Strahler, A.N., 1952. Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topography. *Geol. Soc. Am. Bull.*, 63, 1117-1142.

Strahler, A.N., 1954. Statistical analysis in geomorphic research. *J. Geology*, 62, 1-25.

Winckell, A. (coordinador), 1997. Los paisajes naturales del Ecuador: las regiones y paisajes del Ecuador. *CEDIG, IPGH, ORSTOM, IGM*. Quito, 416 p. + mapa esc. 1:1.000.000.